

農業信箱



蜜蜂起盜注意預防

【問】：(一)我養蜜蜂乙羣已年餘，因蜂羣興旺，故於春初分封為三箱，曾有一日為整理巢箱，工作後即起盜蜂並互鬥之現象，請問是何原因？如何防止？

(二)又曾發現有多數蜂隻頭部有寄生蟲(白色粉狀蟲類)，請問是何種傳染病，如何防治？

(三)臺北汐止鎮八連里四八號謝燈財

高壓蒸魚類

魚骨即可酥軟

【問】：(一)魚罐頭的魚骨頭為甚麼能使其軟酥？

(二)裝罐時是否須化學藥品使其軟酥？

(三)如有藥品是何種，何處可買？

(四)其他動物骨頭如豚、牛等是否也可使其軟酥？(臺北市永吉路二二五巷一弄三五號胡清泉)

【答】：(一)魚罐頭經高溫殺菌處理後，一方面殺菌一方面可使魚骨頭軟酥。

(二)不須使用藥品。

(三)除特殊製造罐頭外，多不加藥品。

(四)其他動物骨頭也可使其軟酥，但處理時間應更長。(朱仙和)

種蠶推芽塑膠保溫

出售鮮蠶二月種植

【問】：請問生蠶用何藥物催芽？種蠶消毒可否用「烏斯普龍」？以鮮蠶出售為目的，應於何時種植？(臺東成功鎮和平里延平路一號孫彥波)

【答】：(一)蠶之催芽溫度為二十五至三十度，故用塑膠布保持發芽適溫，經二星期就發芽，催芽中注意灌水。

(二)種蠶易引起腐敗病，故將種蠶浸漬八百倍「烏斯普龍」液，或其他水銀劑液消毒一小時，然後風乾種蠶能減少發病。

(三)以嫩蠶出售者，宜在二月上旬，中旬栽植。(王進生)

【問】：(一)過去聽說有大粒烏豆，不知現在有此種否，何處可買到。此種烏豆與小烏豆產量比較如何？有無栽培價值。

(二)生育日數須幾天，比小烏豆早生或晚生。性狀與小烏豆有無差別？耐風性如何？(屏東縣枋山鄉善餘村里龍路廿號張榮輝)

【答】：(一)大粒烏豆係百美豆之突變系統，選出之固定後代。在竹田及潮州地區有少部份農友栽培，每公頃產量為一千五百至一千八百公斤，該種除供作醬油或醬料之原料用外，不宜榨油，栽培價值比烏豆好，種子可向竹田鄉農會洽購。

(二)該品種適合秋作栽培，生育日數約九十天，比在來烏豆早熟十五天，莖桿粗大，不易倒伏，耐風性未經試驗無法斷定，枋山地區如欲大量栽培，宜先行試作為宜。(謝英鏞)

【問】：(一)過去聽說有大粒烏豆，不知現在有此種否，何處可買到。此種烏豆與小烏豆產量比較如何？有無栽培價值。

(二)生育日數須幾天，比小烏豆早生或晚生。性狀與小烏豆有無差別？耐風性如何？(屏東縣枋山鄉善餘村里龍路廿號張榮輝)

【答】：(一)大粒烏豆係百美豆之突變系統，選出之固定後代。在竹田及潮州地區有少部份農友栽培，每公頃產量為一千五百至一千八百公斤，該種除供作醬油或醬料之原料用外，不宜榨油，栽培價值比烏豆好，種子可向竹田鄉農會洽購。

(二)該品種適合秋作栽培，生育日數約九十天，比在來烏豆早熟十五天，莖桿粗大，不易倒伏，耐風性未經試驗無法斷定，枋山地區如欲大量栽培，宜先行試作為宜。(謝英鏞)

大粒烏豆適合秋作

【問】：(一)過去聽說有大粒烏豆，不知現在有此種否，何處可買到。此種烏豆與小烏豆產量比較如何？有無栽培價值。

(二)生育日數須幾天，比小烏豆早生或晚生。性狀與小烏豆有無差別？耐風性如何？(屏東縣枋山鄉善餘村里龍路廿號張榮輝)


【答】：(一)大粒烏豆係百美豆之突變系統，選出之固定後代。在竹田及潮州地區有少部份農友栽培，每公頃產量為一千五百至一千八百公斤，該種除供作醬油或醬料之原料用外，不宜榨油，栽培價值比烏豆好，種子可向竹田鄉農會洽購。

(二)該品種適合秋作栽培，生育日數約九十天，比在來烏豆早熟十五天，莖桿粗大，不易倒伏，耐風性未經試驗無法斷定，枋山地區如欲大量栽培，宜先行試作為宜。(謝英鏞)

裕隆牌

陸用柴油引擎

DE-6A型 7.5馬力 NT\$13,860.00



另有DE-4型 5馬力柴油引擎
均參加合作金庫實物貸款

請逕洽各地農會

裕隆汽車製造股份有限公司

臺北市信陽街十六號

◀備有說明書函索當即寄奉▶

病熱稻種萊蓬

請用



日本三共株式會社出品

リオゲン

利農元

包裝 500g 入

包裝 100g 入



製造元：三共株式會社

進口：招德貿易股份有限公司