



桃李可做梅砧木 嫁接後壽命縮短

【問】：(一)桃及李可做梅的砧木嗎？
(二)前月我請專家嫁接梨若干，他們說不要灌水，不知那種說法對。(高雄縣桃源鄉桃源村三四號之儀)

【答】：(一)桃及李可做砧木，嫁接後生長迅速，結果早，惟壽命較短，十餘年後，自發之先端漸行枯死，甚為不利，故很少人採用。
(二)嫁接後灌水與否，乃看當時土壤之情況而定，如土壤有相當濕度，即不應灌水，如土壤很乾燥必須灌水，否則癒合不佳。(朱長志)

龍柏的插枝繁殖法

【問】：(一)「日本森」(ヒムキ)是怎樣育苗？
(二)我有廿年的母樹，要育成苗不知怎樣繁殖，什麼時期最適當。(嘉義縣竹崎鄉內埔村四七號林芳基)

【答】：(一)「日本森」(ヒムキ)經查本省無此類樹木，恐係「伊吹柏」(イブキ)中名為龍柏譯音上之錯誤。
(二)如果確係龍柏，則屬於觀賞樹木，可用插條繁殖。
(三)插條繁殖方法，是在冬季時採集二年生或三年生枝條，長約十五至二十公分，插在砂土或紅土中(傾斜插入)，經常灑水保持土壤濕潤，不可置於烈日下曝曬，直至發根為止。

【問】：如果利用發根素(荷爾蒙)，先將插枝經荷爾蒙處理後再行插入土中，可促進發根，生長尤佳，並可節省時間。
(四)插條時期，最好能在春季樹木開始生長時期為適當，夏季插條不甚適宜，成活率甚低。插條時最好在花盆中施行容易控制，如在苗圃中施行，應加蓋蔭棚。(章榮民)

荔枝的空中壓條

【問】：(一)荔枝空中壓條何時最好？
(二)環狀剥皮的寬度及剥除深度如何？
(三)培養土應如何配製？
(四)綠苔是河川及水池中的綠色絲狀物麼？用時要曬乾，截短麼？
(五)加入「賜保根」應按多少比例？
(六)應如何管理？(屏東縣春日鄉古華國校劉化之)

【答】：(一)荔枝空中壓條以新曆四月最適，九、十月剪下。太早剥皮可能有困難，同時天氣過於乾燥，易受乾熱影響。稍晚，雨季已開始，工作不便，且果實已大，容易損及果實。
(二)環狀剥皮的寬度以一至一·五寸為適宜。剥皮後須將附著在木質部表面的形成層細胞除淨。除淨的方法有二：一為用剃皮刀在表面刮淨。一為剥皮後，任其暴露空中數日，使形成層細胞自然枯死，然後再用發根劑包住。
(三)目前所用的發根劑有兩種：一種是土壤、乾牛糞、切細的稻草，三者等量混合而成；一種是森林陰濕地面生長的苔蘚。以後者效果較理想。
(四)苔蘚是森林陰濕地面產生的。採收後，曬乾貯藏。用時再浸入清水一晝夜，使充分吸水。不是池塘裡的水苔。
(五)荔枝空中壓條發根很容易，實際用不着再塗其他植物生長素等藥劑。
(六)用塑膠布包裹的發根劑，在雨季期間不容易乾燥。無需特別管理。在雨季快結束時剪下便可。(張振出)

火雞腳部癱瘓症 試用硫酸銹治療

【問】：請問火雞腳部癱瘓症的病因為何？其治療及預防方法如何？(彰化縣秀水鄉福安村民意街廿一號王贊)

【答】：火雞腳癱瘓的病因很複雜，但其主要者是缺乏礦物質，尤其是缺乏硫酸銹，飼料中除了應給與骨粉及食鹽外，應加些

中農化工廠股份有限公司啓事

地址：臺北市南陽街21號2樓

本公司為推廣產品，特設置每鄉鎮獨家特約經銷商，推廣本公司各種農藥。凡有意特約經銷者，均可照左記申請合約表格，填妥後寄至本公司業務部，以便派員前往辦理訂約手續為荷。

申請合約表格

資本額	商號	負責人	地址
營業登記	營業證	擬經銷地區	
備註：鄉鎮農會或農會團體免填資本額與營業登記證			

農藥牌方圓

萬特松 乳劑
最新低毒性

稻特松 乳劑

米農 乳劑
水銀乳劑



圓方牌

其他各種農藥及允多收，美綠元，ポリオン，愛果麗等。

允發農化工廠有限公司

台北市西園路二段167號 TEL.36549