

用一杯愛多收



增加產量!! 提早收穫!! 改良品質!! 防止落果!!

種子浸漬
灌注
葉面撒布

愛多收

(アトリニツカ)

新包裝
開始銷售



旭化學工業株式會社出品

總代理 臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路44號
電話：45437·41119

栽培阿薩姆茶注意技術改進！ 李振昌

本省專供製造紅茶的阿薩姆種茶，樹冠寬大，分枝稠密，芽頭肥大，單位面積產量高，所製造的紅茶，香味芳醇，價格好。

阿薩姆茶在溫暖多濕無風的環境裏生育良好，年平均溫度攝氏二十度左右，終年無霜，雨量二千公厘以上，且分佈均勻，朝夕有濃霧的氣候，最適宜阿薩姆茶的栽培。本省中南部及東部海拔二百五十公尺至一千三百公尺的地力中等以上，且無強風的地區，表土深厚有機質豐富，酸鹼度四〇至五·五的壤土或粘壤土都可以栽培。

阿薩姆茶栽培方法，今後應着重

於綜合性耕作技術的改進，減低生產成本，提高單位面積產量，這樣才能增加農人們的收益。

阿薩姆茶的栽培法，應改良的幾個問題，都經過試驗應用，茲介紹如下：

扦插繁殖茶苗

茶樹是天然雜交的作物，用種籽繁殖，很容易混雜、退化，失去母樹原來的特性。改用扦插繁殖的茶園，就沒有這種缺點，可以完全保持母樹原有的優良特性，產量高，品質好，而且發芽整齊，管理容易，收入增加。阿薩姆茶無性繁殖詳細方法如下：

(1) 使用長枝塑膠袋扦插法：平均成活率在百分之七十五以上，扦插五至六個月後即可出苗，為短期成苗有效方法，尤適於茶園缺株補植。

(2) 長枝條田間直接扦插，上套塑膠袋，再行覆草方法。扦插一百一十天後鬆開塑膠袋的頂端處理，一年後成活率因品種的不同，可達百分之五十四至八十，生長情形也好。如加施堆肥於植孔，比不加者可提高成活率百分之九。

(3) 使用毒線蟲 70EDBCP (Fumazon) 一百五十倍濃度消毒苗床，可提高茶苗成活率百分之十九。

(4) 普通扦插繁殖，枝條長度

以五至十公分為佳，但以八公分左右最佳。植物生長素以使用 I-N-A-A，對於促進效果最佳。

(5) 為節省育苗灌水勞力，進行扦插時僅僅灌水一次，覆蓋塑膠布處理平均成活率百分之八十一；適於秋季繁殖，不加覆蓋而經常灌水的普通處理成活率為百分之七六，唯後者生長情形略佳。

(6) 為縮短苗期，加速繁殖新品種起見，可採用一年生枝條進行簡易高取繁殖法，半年即可取苗，包裝所用土壤，如使用生長素 I-N-A-A 二千倍處理，效果很好。

茶苗扦插繁殖，經一連串試驗後，已推廣至本省種植阿薩姆茶主要的茶區，普遍獲得成功，魚池茶業試驗所在南投、臺東、花蓮縣境所設扦插