

(7) 茶菁採收後處理：  
 ① 採下茶菁不可弄傷，隨即放入茶籠，不可積壓。  
 ② 使用竹籠貯運茶菁，避免使用麻袋損及品質。

多施配合肥料

茶樹為多年生採葉作物，一年採摘十數次，消耗地力很大，必須經常補給養分，尤其氮、磷、鉀最為重要。一般農友們只知道施用氮肥，認為磷及鉀肥無效，但事實上缺乏磷與鉀則根羣貧弱，易使茶樹早期衰老及死亡，應將氮磷鉀三種肥料配合施用才能發揮效果。

撲滅兩大害蟲


在阿薩姆茶園中為害比較嚴重的

兩種害蟲是茶天牛和木蠹蛾。茶天牛的幼蟲，蛀食茶樹主幹和根部；木蠹蛾則蛀食茶樹枝條。這兩種害蟲，都可使茶樹衰弱，為害嚴重的時候，茶樹甚至枯死，因而普遍發生缺株，影響茶園生產。

撲滅茶天牛的方法，是找出被害茶樹將殺蟲劑一〇% BHC 乳劑五百倍液，或地特靈一千倍稀釋液，灌入蟲孔內，注滿後用泥土塞住蟲孔殺死幼蟲。木蠹蛾防治，只是將被害的茶樹枝條，用手折斷或用刀砍斷，將幼蟲連枝條一齊放火燒掉，或用手指擠死幼蟲。  
 採茶期中使用農藥防治病蟲害很危險，除非萬不得已，否則最好盡量避免。

重視冬季防治

(阿薩姆老茶樹深剪更新的方法)



大多數害蟲，以蛹越冬，冬季防治，以使用 DDT 二十五% 乳劑三百倍液在剪枝後隨即撒布一次，並春茶季一個月前（即二月中旬）再撒布一次，不但安全經濟，又可得到很好的效果。茶園冬季防治工作是值得提倡的。

強力殺蟲劑

スミチオン

速滅松

人畜無害 毒性低微

日本原裝 品質保證

- 特點：
- ① 速滅松對人畜的毒性極低微，祇有巴拉松的百分之一，因此可安心使用。
  - ② 速滅松之殺蟲力、滲透力強列，對水稻二化、三化螟蟲及其他主要害蟲之殺效優於巴拉松，且其殘留性優越。
  - ③ 速滅松之適用範圍甚廣，對水稻、大豆、香蕉、果樹、蔬菜、茶等之害蟲殺滅有優越效果。
  - ④ 速滅松對農作物不發生藥害。
  - ⑤ 速滅松對魚介類之毒性低微，而對魚塢中之紅筋蟲殺滅有優越效果。



現貨供應

農藥字第139號

製造元



住友化學工業株式会社

總經理處

瑞豐股份有限公司

臺北市長安西路172巷1號 電話：46640