

蛋黃果接穗，需環狀剝皮

【問】：(一)請問蛋黃果與人心果是否屬於同科之果樹？是否可用人心果做砧木，蛋黃果做接穗行嫁接繁殖？其方法如何？

(二)用蛋黃果之種子播種，要經多久才發芽？又發芽後須幾年才能實行嫁接？

(三)此果樹在本省是否有栽培經濟價值？其栽培希望如何？

【答】：(一)此果樹之品種有幾？那種較好，何處有出售？(臺中太平鄉興隆村興隆路三〇號簡榮烈)

(二)蛋黃果與人心果同屬山欖科(或赤鐵科)。人心果不適合作蛋黃果的砧木，因人心果初期的發育很慢，蛋黃果發育很快。嫁接蛋黃果在接穗未剪下以前，須先將接穗枝作環狀剝皮，待六至八星期剪下嫁接，成活非常容易。未經環狀剝皮處理的接穗，不易成活。

(三)蛋黃果播種後約需一個月發芽，經過一年便可嫁接。

(四)蛋黃果不是一著名經濟水果。可以作庭園栽培，不宜從事企業性栽培。

(五)蛋黃果尚未經選種，實生種中，雖果形各有差異，但風味都差不多。現在嘉義縣三界埔吳添水熱帶果樹園有幼苗出售。(張振宙)

枇杷幼果腐爛病

用波爾多液防治

【問】：寄枇杷果粒標本，有銹狀斑點係何病？應用何藥，在什麼時間防治？如花苞未開放時使用，是否發生藥害？(臺中縣太平鄉頭坑賴演標)

【答】：(一)所寄來標本枇杷果粒，係腐爛病發生於幼果者。

(二)一月下旬至六月之間，撒佈七—七式「石灰波爾多液」四—五次防治。

(三)通常作物在開花期撒藥，易引起藥害，宜加以注意。(吳福壽)

番茄「馬娜露西」

不適合夏季栽培

【問】：(一)番茄「馬娜露西」種對「卜

マートン」處理反應如何？

(二)「馬娜露西」銷路情形如何？

(三)「馬娜露西」是否適合夏季高溫期栽培？何處能得純種種子？(彰化溪湖鎮大突里一〇八號楊弘龍)

【答】：(一)「馬娜露西」番茄不宜用「トマトン」處理，因易變形。

(二)對於目前之外銷情形不詳，將來外銷地以琉球為近，內銷以臺北市場。臺中市場因喜愛桃色品種之關係，其銷路不暢，故如以臺中市場為對象宜改種「寶冠」。

(三)「馬娜露西」不適合夏季栽培，種子可向鳳山農友種子行洽購。(王進生)

栽培越瓜注意事項

【問】：(一)早期越瓜何時種，每分地要種子多少，如何播種。

(二)栽培管理要點如何，有何病蟲害，如何防治。(臺中縣清水鎮柳里繁峰路一九四號王永昌)

【答】：(一)在實地早期越瓜可從二月中至三月下旬播種。但自二月上旬至七月是播種適期，故隨時可以下種。

(二)每十公畝之播種量一百八十公克左右。種子宜用錫保根五百分之一拌種消毒。

(三)畦寬一·五至一·八公尺，株距六十分，點播，每穴四—五粒，於葉二—三葉時每穴留一株。

(四)每十公畝施用一千八百公升堆肥外，另施用化學肥料，其三要素施用用量為氮素十六—十八公升，磷酸十二公升，鉀質十三—十五公升。

(五)從本葉二—三葉開始噴射「大生七八」可濕水粉劑四百倍液，每七—十天噴射一次繼續二、三次，防治露菌病及炭疽病。白粉病宜噴射可利生一千倍液，又守瓜宜噴射賽文一千倍液，蚜蟲噴射馬拉松液防除。


(六)於本葉四—五葉展開時摘心，留四枝之子蔓(四枝整枝)為宜。於本葉四—九葉開始用稻草畦面覆蓋。(王進生)



台中牌

台中肥料

種類	肥料名稱	種別	種類	肥料名稱	種別
複合肥料	柑桔有機質肥料	春用	特殊肥料	新三要素	
	柑桔有機質肥料	夏用		珪酸肥料	
	柑桔有機質肥料	秋用		苦土石灰	
	柑桔有機質肥料	幼樹用		骨粉	
複合肥料	香蕉五要素肥料	生長用	液體肥料	葉的營養	
	香蕉五要素肥料	品質用		花的營養	
	五要素複合肥料			果的營養	
	三要素複合肥料			微量營養	



柑桔 依四季變化所須要的不同營養
香蕉 依發育變異所必要之營養

台中肥料 據各作物的必要成份以科學調節好
確實肥効大

果汁 為什麼很酸 使人不歡迎
果實 為什麼會腐爛 不適外銷

台中肥料 對果子的品質控制有科學的調配
一定果實好

台中肥料廠

台中市大公街六七號 電話七二五〇號