

聞名世界
美國杜邦農藥



請農友們注意！

應用「依必安」徹底防治
水稻二化螟蟲的方法！

45%「依必安」乳劑加水1.000倍，每公頃約用800至1,500公升，根據稻株大小調節藥水噴量。藥水盡量噴到水稻莖部。插秧後一個月左右，稻株生長繁茂，葉片互相擁覆時，就要將噴頭插入行間，才能將藥水噴上莖部。噴藥時先排去田水比較好，要特別注意噴藥時期，莖（葉鞘）被害變黃時，要即刻開始防治。因為二化螟幼蟲先在最外葉鞘吃一段時間，以後才進入稻莖中心為害，中心部份被吃斷時才發生枯心，所以等到發現枯心時被害已達到不能治療的程度，噴藥已嫌太晚。（原載「豐年」14卷5期第15頁）

臺灣省農林廳植物保護會推廣：

水稻二化螟蟲殘效性特效藥！

依必安® 45% 乳劑
EPN® EMULSIFIABLE INSECTICIDE

依據農試所及農業改良場試驗報告

使用 依必安 之稻穀增產率達

17.7~32.2%

美國杜邦公司工、農藥部

臺灣總代理：合裕貿易股份有限公司

特約技術指導調配廠：新生農化廠股份有限公司