

香 蕉 的 選 苗 地 選 和 種 植

朱 慶 國

目前本省香蕉平地栽培面積已超過外銷需要，並不獎勵增加面積，本文只供養有蕉園更新和坡地栽培的參考。

性喜溫暖多濕氣候

香蕉是熱帶果樹的一種，性喜溫暖多濕，每月平均溫度以華氏八十度（攝氏二十六度），降雨量每月四吋（一百公厘）最為理想，氣溫低於華氏六十度或過於乾燥，都會影響香蕉發育。本省十二至二月間氣溫低，雨量少，所以香蕉發育緩慢，尤其是無法灌溉的山地栽培，發育更受影響。香蕉忌霜害，本省海拔六百公尺以上地區容易受霜害，不宜種植香蕉。

香蕉有巨大葉片，它的幹是缺乏木質部的脆弱偽莖，又是草本淺根，很容易遭受風害，強風地區不宜種植香蕉，蕉園受風地方，一定要種防風林。

砂質壤土生育最好

香蕉除了砂土、粘重土和排水不良區域外都可栽培，但以有機質豐富表土深厚的砂質壤土為最優，在水份充足或河溪二邊土壤濕度高地區比較輕鬆砂土仍可種植。至於無法灌溉山地，含水力弱的砂土，都不宜種植。平地含水力強的粘重土，常思排水不良毛病，也不適宜種植香蕉。土壤酸鹼度五至七都可以栽培，但以五·五至六·五為宜，過於酸性或帶鹽分的鹼性土壤，也不十分適合。

山地平地蕉園選擇

選擇蕉園，除上面所說的氣候、土壤外，還應注意下列二點：

(1) 山地栽培：本省中部和花蓮、臺東栽培香蕉，多在山地，應選擇海拔不太高，坡度不超過三十度較為避風的山坡地為宜，並應該做水土保持。背風的蕉園，可以不種防風林，受風的地方，一定要種防風林。並以選擇表土深厚、肥沃的腐植壤土為宜。

(2) 平地栽培：本省南部和彰化、雲林多在平地栽培香蕉，應選擇土層深厚，排水優良的沖積砂質，或腐植質壤土和砂質壤土，四周有防風林的地區為宜。灌溉方便的地方，才容易調節開花期和採收期。

優良蕉苗判定方法


(1) 品種：目前仍以以仙人掌和北蕉為理想。

藥 農 豐 正

帶給您：

豐 收 · 快 樂

商 註



標 冊

||

信 服 誠
實 務 懇

<p style="text-align: center; font-weight: bold;">正 豐 松 乳 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">稻：螟蟲、浮塵子、棉花蟲等</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">地 特 松 粉 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">低毒性，為萬能之殺蟲劑</p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold;">寶 利 多 乳 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">稻螟蟲、害蟲等，殘效性持久</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">多 穗 粉 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">稻紋枯病、象皮病等特效</p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold;">特 殺 松 乳 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">稻螟蟲、蚜蟲、青蟲、絲蟲等</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">阿 蘇 仁 粉 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">稻紋枯病、露菌病、日病等</p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold;">正 滅 松 乳 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">稻螟蟲、夜盜蟲、吃心蟲、捲葉蟲等</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">新 滅 菌 乳 劑</p> <p style="font-size: 0.8em;">稻紋枯病之剋星</p>

正 豐 化 學 股 份 有 限 公 司

中 縣 霧 峯 TEL. 63