

蔬菜害蟲防治新法

葉菜類

(一) 夜盜蟲和切根蟲
 ①收穫期：採收後，將廢棄菜葉做成數堆（每分地約二四堆），放置二至四天後，翻開菜堆，如發現夜盜蟲或切根蟲，隨即以四〇%「阿特靈」可濕性粉劑加水四百倍噴殺（菜葉上加沾到藥液不可用作飼料）。

②生育期：施用左表藥劑（任選一種）防治：

藥劑名稱	稀釋倍數	施用時期
二五% DDT 乳劑	三〇〇—五〇〇倍	採收前廿一天以上時使用
三五% 殺蟲淨乳劑	一、〇〇〇—四、〇〇〇倍	同右
五〇% DDVP 乳劑	一、〇〇〇倍	採收前四天停止用藥
五〇% 馬拉松乳劑	五〇〇倍	同右

(二) 小菜蛾：施用左表藥劑（任選一種）防治：

藥劑名稱	稀釋倍數	施用時期
六〇% 大粒農乳劑	一、五〇〇倍	採收十四天前
三五% 殺蟲淨乳劑	一、〇〇〇—四、〇〇〇倍	採收廿一天前
五〇% DDVP 乳劑	一、五〇〇倍	採收四天前

(三) 擬尺蠖（俗稱青蟲）：以五〇%「賽文」可濕性粉劑加水一千倍防治，至收穫前七天停止用藥。

(四) 菜心螟和大菜螟：在蔬菜採收期二十一天前，施用二五% DDT 乳劑，加水三百至五百倍防治。

(五) 黃條葉蚤：施用左表藥劑（任選一種）防治：

藥劑名稱	稀釋倍數	施用時期	備註
二五% DDT 乳劑	四〇〇倍	採收廿一天前	防治成蟲
三五% 殺蟲淨乳劑	一、四〇〇倍	同右	''
五〇% 馬拉松乳劑	六〇〇倍	採收四天前	
五〇% 賽文可濕性粉劑	一、〇〇〇—五、〇〇〇倍	採收七天前	

(六) 蚜蟲類和薊馬類：用左表藥劑（任選一種）防治：

藥劑名稱	稀釋倍數	施用時期
五〇% 馬拉松乳劑	一、〇〇〇倍	採收前四天停止用藥
三〇% 魚藤精乳劑	一五〇—五〇〇倍	同右

(七) 蝶蛄、蟬蟪白蟻和臺灣大蟀等：參照土壤害蟲防治方法。

豆類

(一) 青椿象：施用左表藥劑（任選一種）防治：

藥劑名稱	稀釋倍數	施用時期	備註
五〇% 速滅松乳劑	一、〇〇〇倍	採收十天	在若蟲期施藥，務使濃度準確
五〇% DDVP 乳劑	二、〇〇〇倍	採收四天前	同右


(二) 豆蚜：參照前面蚜蟲防治法防治。
 (三) 紅蜘蛛：在採收期七天以前以一八·五%開路生可濕性粉劑加水五百倍防治。

瓜類

(一) 黃守瓜：以五〇%賽文可濕性粉劑加水五百至一千倍防治。

(二) 瓜蠅：開花結果後，每隔五至七天噴射二五%「馬拉松」可濕性粉劑和蛋白質水解物四百倍稀釋液，至採收完畢前為止。（信信）

！明證的鋼，實事的鐵！看



キングバイヒ 金倍肥

保障您們增收的唯一聖品

聞名世界的液體綜合肥料

適用豆類瓜類香蕉鳳梨

全省各級農會大農藥行均售

(說明書備索)

臺灣永裕實業股份有限公司榮譽出品

顧問：東京農大教授 農學博士 南 禮藏

肥料研究室主任 理學博士 濱 田 次 人

總公司：臺北南京路四二二號之四 TEL53052號
 彰化廠：彰化縣溪州鄉中山路一七七號 TEL67號