


！茄番培栽夏初 ？益收證保樣怎

生進王



茄番夏初的好良實結

初夏(或高冷地)栽培番茄，因受氣候環境的影響，果實常常變形，單位面積的產量也不大理想，要想保證收益，請注意下列的幾項管理工作：

防止落花落果

造成落花的遠因，為番茄在育苗期間遭遇低溫，乾燥和陰天，或假植時苗齡與花芽分化期相衝突。

一般在生育初期施用氮素過多，植株過度茂盛，透光不良，也是造成落花落蕾的原因。初夏夜間溫度過高，也會發生落花

落蕾。又番茄花粉在攝氏三十五度時授粉機能差，授精情形不良或授粉不完全，這時候也會引發落果。

防止方法：

①天氣長期亢旱，園地水分缺乏時，應注意灌水，尤以粘質土乾旱時，影響程度較大，所以在紅土地栽培番茄，不但要勵行灌溉，且須配合畦面覆蓋，俾使土壤保有適當的水分。
②一般說來，大果品種落花落果較多，應注意生育初期氮肥用量，或者等到第一段果實發育膨大至指頭大小後再視植株生育情形開始追肥為宜。如發現生育初期植株呈發育生長不良時，應及時施用追肥，否則植株因缺肥關係，第三段以上花房無法長大，落花落果也多。

③育苗中如天氣寒冷，應利用塑膠布保溫，以免苗株莖葉受凍，花芽形成不良。

④開花盛期如遇高溫(攝氏三十五度)時，宜用一百倍「番茄多旺」稀釋液處理花房，處理時間以下午四時至傍晚陽光較弱時為宜，以減少畸形果的形成。

防止果頂腐敗

今年天氣乾旱，土壤缺少水分，植株根部水分供應不足，果實水分被轉移至葉部，果實水分缺乏，容易發生果頂腐敗病，影響產量。尤以淺耕土的粘質地和保水力很差的砂質土發病較多。如對品種來說，小果種發病少，大果種(如馬露露西和皮爾遜種)在天氣乾旱時發病較多。

防止方法：①選擇耕土深且肥沃的土地栽培，並應施用多量腐熟堆肥，勵行深耕，覆蓋畦面，增加土壤保水力。如遇長期乾旱時須繼續灌水。

②噴射氯化鈣或硝酸鈣〇·五%稀釋液。應以噴射新葉部和果實為主，以利吸收。

防止疫病為害

春季初夏雷雨連綿，晚疫病極易發生。植株過於茂盛，通風通氣不良再加上環境多濕發病尤為厲。

◎ 注 意

1. 本劑係液體化學肥料，非植物荷爾蒙劑。
2. 本劑不可與石灰巴爾特、石灰硫黃合劑、松脂合劑、銅水銀劑、硫酸石灰等農藥混合使用。
3. 與本劑不可混合使用之農藥應於散佈本劑前後隔三天以上方可使用。
4. 散佈量使葉面罩上一層薄霧似的程度為宜。

請將使用經過連附 500cc 裝商標剪下一張(250cc 裝二張)一併寄來敝公司者，另贈紀念品。

(植物綜合微量要素·葉面散佈劑)

施葉養元 シオヤゲン

促進發育 提早收成 預防病害
防止落果 提高品質 增加收成
水稻、豆類、蔬菜、蘆筍、洋菇、蕃茄、菸草、茶、香蕉、鳳梨、柑桔、瓜類、其他農作物。

協和化學工業股份有限公司

臺北市華陰街三九號 電話：46980



說明書函索即寄