

苗宜在二%以下，大株濃度高達五%也不發生藥害。所以夏季因落雨不能進行土壤施肥時，可採三至四%濃度尿素行葉面噴施，增強活力。

### 留果不宜過多

夏蕉單株產量，僅次於春蕉，但是品質遠不如春蕉。這是因為夏蕉開花坐果正逢高溫高濕的落雨期，組織發育快，肉質鬆，味淡，皮軟，生長期短，營養供給因受天時的影響不能依時施用。為調節養份，控制養份，促進果實發育，夏蕉的整疏工作是不可忽略的。

夏蕉果手不能留得太多，普通一個葉片養一個果手，依此標準酌留七至八果手。其餘下端果手都要疏去。

### 多加支柱防颱

七至九月是夏蕉收穫期，也是颱風期，因此要多加支柱，縛紮堅固，方可減少颱風損害。夏天雨水多，土壤濕軟，支柱必須插得深入土中二至三臺尺。(一般沖積砂土深些，砂壤土稍淺些)，否則颱風來時稍吹即倒。

### 保持園內清潔

夏季蕉園，因雨水過多，並且忙於春蕉收穫，老株不能立時清除，七零八亂，倒於園地，落雨即能阻塞排水，尤以低窪或排水稍差蕉園，受雨水沖刷，蕉根外露，都能影響夏蕉發育，減低品質。因此，夏蕉清園割枯葉，砍收穫老株，覆蓋等都應注意。

### 防治二種病害

夏季蕉園易生蚜蟲，蚜蟲是傳染萎縮病的媒介，應隨時噴八百倍「馬拉松」防治，同時夏季過於濕潮，果實易生黑星病，應以四十四式波爾多液噴佈防治。



**補齊不全要錯過機會**  
本刊長期訂戶請注意：你保存了全套「豐年」，缺少其中的幾期嗎？請不要錯過補齊全套「豐年」的機會。  
請在五十四年六月十五日前，說明你需要的卷期號碼，向本刊讀者服務部購買，每本二元。十元以下的，請附寄郵票。十元以上的，請利用郵政劃撥貯金五九三〇號本社帳戶。

## 適合多種作物，增加收量二成以上

### 有機質混合肥料

# 五 谷 牌

註冊



商標

台灣省檢驗局檢查合格  
台製字第 10002 號

△**五谷肥**：含有氮21%、鉀3%及植物生長要素多種，使葉莖強韌，促進生長，發育健全，不易倒伏，適用水稻、鳳梨、香蕉、竹筍、雜糧等。(可以混合磷鉀銨使用)

△**磷鉀銨**：水溶性的有機質肥料，容易被植物吸收，增強病蟲害抵抗力，提高品質及產量，適用豆類、瓜類、蘆筍、蔬菜、什糧等。

△**青果肥**：含有氮12%、磷3%、鉀6%、有機質25%矽、鎂、鈣、鐵、錳等之綜合最新有機質肥料，改良土壤特有卓越效果，無需再施用任何他種肥料，最適合柑桔、香蕉、鳳梨、西瓜、蘆筍、蔬菜等其他作物。

**健興肥料股份有限公司**  
三重市大有街26~1號 電話：97-2791

