

農業信箱

茶油十二月播種

經一年後可移植

茶油，未知茶油種籽或種苗何處有售？何種土壤適宜，栽培法如何？（花蓮縣瑞穗鄉農會）

【答】：（一）目前省內似無專門栽培茶油樹之農友。

（二）種子於九、十月間可收穫，如需要可逕向北部農會接洽購買。

（三）粘壤土至沙壤土均可栽培。

（四）繁殖法可將九、十月間採收之種子，晒乾後於十二月間播種，約經二十天後發芽，於翌年十二月至後年一月間（經過二年）可移種。

（五）栽培行株距均為四公尺（十三臺尺），每十公畝栽植六十五棵。

（六）栽植後四、五年，每株可種子二十至四十公斤。（花蓮改良場）

【問】：北回歸線每年移動多少？現在之真正緯度多少？即在嘉義何地？（嘉義番路鄉內裡村瓦厝二號張喜詠）

【答】：北回歸線每年向南移動○.一六八秒，目前真正緯度尚未測定，惟據推算，現在北回歸線之真正位置，可能在現有標誌之南方約七百餘公尺處。（省氣象所）

臺東平地紅棗產量不高

【問】：（一）臺東鹿野鄉平地，可否栽培紅棗（藥用），不是印度大棗。

【答】：（一）紅棗苗臺灣有否？何處有售？產量若干？有否栽培價值？

（二）紅棗品種有幾？何時栽培，行株距多少？每分地種幾株？幾年可生產，何種肥料較適合？病蟲害防治法如何？（臺東陸蔭農場陳孝先）

【答】：（一）臺東平地栽培紅棗，雖能生長結果，但因氣候關係，生育不佳，難得正常之產量。

（二）紅棗苗中興大學園藝系有，但未大量繁殖，在臺灣尚無正式產量調查，銷路雖有，惟恐經濟上不合算。

（三）紅棗品種目前只有三種，栽培適期為十二月至二月間，行株距五公尺左右，宣期品種與土質氣候而異。每分地栽培三十株左右，其產量則視管理與地方環境而異，肥料仍需用有機肥料與化學肥料。棗也有食葉類害蟲，如「棗娥」等，可撒佈胃毒劑，棗之病害不多，如棗的「枯葉病」「斑點病」等可用波爾多液防治。（朱長志）

硫酸鎂・苦土石灰

兩種肥料性質不同

【問】：（一）硫酸鎂與苦土石灰在性質上

有何不同，兩者成分如何？苦土石灰可否與其他肥料如硫鎅、尿素、氯化鉀、過磷酸鈣等混合使用？

【答】：（一）骨粉據說是微鹼性，可否與硫鎅、鉀肥等混合使用？（湖口郵政七四七信箱羅蒸靈）

【問】：（一）硫酸鎂為製鹽副產品，含有

不同），為一種中性水溶性速效肥料，適用於果樹、油脂作物、水稻、小麥及蔬菜等。

苦土石灰為製鐵、玻璃工業原料，其原石為

苦灰岩，以炭酸苦土石灰之形態存在，為一

後立刻施用，與氯化鉀可混合施用。

（二）骨粉與磷鉀肥可混合施用，但與硫酸銨後立刻施用為宜。（吳石生）

請用：

西德 K. D. Feddersen & Co.

榮譽出品 世界微毒殺蟲劑

農藥登記證：

農藥字第〇三九八號

加巴美
50% 可濕性粉劑
Carbamate
50% W.P.



經銷處：泰洋股份有限公司
臺北市重慶北路二段 108 號
電話：44994

臺北市天水路 2 號之 4
電話：43802

臺中縣霧峯鄉草湖路 2 號
電話：霧峯 63

臺北市長安東路二段 16 號
電話：52093

東益貿易公司
正豐化學股份有限公司

總代理：惠農股份有限公司

防治：水稻、柑桔、
鳳梨、蔬菜等

香蕉的留芽・除芽・施肥

【問】：（一）秋、冬、春、夏等各種蕉之留芽方法如何？每株可留蕉苗幾株？
（二）除去多餘之蕉芽方法如何？

（三）施肥方法每年幾次？三要素之配合法如何？每株施用量多少？（屏東縣萬丹鄉社皮村六六號林岳）

【答】：（一）生產秋冬蕉要留九十二月出土的芽。生產春夏蕉要留三十五月出土芽，同時利用施肥與灌水來控制生產時期，每株以留一大株（母株）和一小株為原則，惟在颱風季節可多留一、二芽，以防被斬後之補救用。

（二）蕉株除依定時留芽外，其他無用芽皆需挖除。普通除芽法多利用鐵製方形鏟，在靠母株旁將芽切掉，最科學且方便，不傷母株的除芽法是將芽體割斷後，於截面中心挖一小洞，灌入煤油二三（苗高二十公分分株莖四三公分），即可致死芽體而不再發生，苗小葉量更可減少。（詳參閱本刊十三卷十一期）

（三）香蕉施肥三要素配合量為二比一比六或二比一比四，即每年每株應施硫鉀一·五臺斤，過磷酸鈣一·一臺斤，氯化鉀一·三臺斤（平地蕉），並分六次施用計六、十二月施十多次，七、十一月施十五次，十月施二十次，九月施三十次。
（四）採用行株距二·四×二·一公尺，密植增產，計每分地栽一百八十五至二百株，平均可生產二千至三千公斤。（王兆全）

幾種果樹適用的砧木

【問】：（一）南投縣埔里地帶，海拔約八百公尺，土壤黃色，可以栽培文旦、西印度櫻桃、酪梨、大梨、蛋黃果等否？
（二）前述各果樹用何種砧木最適？
（三）苦桃除接桃及李外，還可接何種果樹？
（四）南投埔里鰲溪路十六號張文華？

【答】：（一）中部山地海拔八百公尺之地區，如冬季無霜，所列五種果樹均可種植，但西印度櫻桃及蛋黃果稍嫌溫度低些。
（二）文旦用酸柑砧。西印度櫻桃可用實生法，嫁接用共砧。酪梨砧木多用墨西哥齡

梨。大梨用烏梨砧。蛋黃果通常用種子繁殖

。 （三）苦桃苗除供桃李砧木外，尚可供梅及杏之砧木。（朱長志）

番石榴的配肥量及施肥法

【問】：（一）十五卷三期農業信箱上，番石榴施肥配合式八一八一八式或十一十五式，各種肥料用量多少？

（二）番石榴一、二、三年生需要施肥多少次？每株每次施肥多少？（臺北縣雙溪鄉上林村內平林五號廖德嚴）

【答】：（一）番石榴定植後，第一年施用八一八一八式或十一十五式化肥三分之一磅，一年施四十五次。
（二）第二年，每次施上述肥料半磅，三四次。

（三）第三年，每次施上述肥料一磅，三四次。

（四）在主要花期前約一個月，施用含氮量高的肥料，可增加新的結果枝及開花數。

（五）八一八一八式肥料配量為硫酸鑀四十斤，過磷酸鈣四十四、五斤，硫酸鉀十六斤（或氯化鉀十三、五斤），十一十五式配量為硫酸鑀五十斤，過磷酸鈣五十五、六斤，硫酸鉀十斤（或氯化鉀八、四斤），（張振宙）



芽，變為木芽，是指何意，如何鑑別？

（二）去年十月栽植之蘆筍，在未收嫩莖前，其較細莖枝，是否可以拔除？

（三）蘆筍嫩莖，洗後生食，是否可以。

（四）現在是否可大量栽植，將來銷路如何？

（五）雲林褒忠鄉王厝村二四號林慶？



請用增加豐收的光牌硫酸鎂

◎根據日本農林省實驗結果：

硫酸鎂與三要素混合施用於水稻、柑桔、鳳梨、香蕉、甘蔗、菸草、花生、豆類，及各種農作物，保證您將會獲得增加單位面積產量二成以上。

◎效用：

- 促進植物產生葉綠素。
- 促進氮（窒素）、磷、鉀、肥料的效能。
- 防止植物之枯死、落葉、果實之掉落。
- 促進植物體內蛋白質及新陳代謝作用，而使根莖強壯，桿部、稻莖，不易倒伏。
- 改良酸性土壤還原為中性。

光正股份有限公司

地址：士林鎮後港里五十五號之一
臺北連絡處：明正貿易行 豐寧街四十六號
東勢連絡處：東太行 東勢鎮北興里豐勢路二七五號
雲林連絡處：斗六鎮大同路48號
嘉義連絡處：勝山行 嘉義市吳鳳路412號



施用硫酸鎂可增產一至二成

電話：(94) 2556
電話：33327 • 27170
電話：206
電話：258
電話：4043

(二)如植株過密，通風不良，可將部分細小莖枝拔除。

(三)蘆筍不宜生食，因土壤中之類會附着嫩莖，不太衛生，且生食時帶有苦味。

(四)蘆筍之前途繫在品質，如品質良好前美，為發展蘆筍事業，如能先研究調查各國之市場及人民之嗜好，例如西德偏愛剝皮，其他各國喜愛不剝皮的嫩莖。日本、美國、西德及加拿大喜愛中大以上之嫩莖，但瑞士市場則喜愛細小的嫩莖等。故應按各國之嗜好，製造各種罐頭，才有拓展之可能，前述必樂觀也。(王進生)

洋菇栽培的新方法

可到草屯農會參觀

【問】：(一)「土地公肥」與肥料配合可否噴灑洋菇，請指示方法。

(二)現在洋菇漸生出大條的根(如蒲根)，收量漸減，該用何法補救？

(三)請指導洋菇栽培的新方法？(南投名間鄉廈新村五三號謝純誠)

【答】：(一)本省洋菇栽培歷史很短，究竟是否適用尚需考慮，請勿聽信，以免浪費。

(二)洋菇栽培至末期時，會形成粗大的菌根，目前的補救方法，是將粗大的菌根拔去，然後重新蓋上新的覆土，經過一段時間後，自然會繼續由上面下生出幼小菌絲。

(三)有關洋菇新的栽培方法，可到南投草屯鎮農會推廣股參觀，該處有農林廳舉辦「洋菇栽培綜合示範試驗」。(胡開仁)

唐菖蒲休眠後
發芽才能整齊

【問】：我在去年由臺北某種子行，購得蘭珠草多種，去年新厝九月間下種，結果發芽者寥寥無幾，經二個月後，將無發芽的掘起，但

多半已腐爛不能再做種用，經此失敗後，始



是促進發芽或抑制發芽，其冷藏期最長幾日，實際冷藏注意事項，有無其他催芽方法？

(澎湖馬公第一銀行澎湖分行黃迺甫)

【答】：唐菖蒲(福蘭)的球莖收穫後，需要經過一段時期的休眠，才能發芽生長。在休眠期間如果得不到充份的休眠，發芽就會不整齊，生長不旺，開花不好，並且會變質退化。唐菖蒲較為優良的品種或國外引進的品種，因本省氣溫較高，休眠期間無

法充份休眠，所以普遍多用低溫貯藏，使其在休眠期間能够充份休眠。普通低溫貯藏的溫度以攝氏四度最理想，貯藏時間為三十天。從冷藏室取出後，仍需繼續貯藏，待其發芽後再行種植，如果沒有發芽即行種植，球莖容易腐爛，如果要想延遲球莖的發芽，在冷藏時間應延長到九十天。除了冷藏外，唐菖蒲的品種、球莖大小及種植深度等，均可用來調節花期。至於寒芽，低溫貯藏亦有能芽作用，用藥劑處理可用ethylene glycol，但在本省栽培很少用藥劑催芽。(謝靜芳)

芙蓉可用播種及扦插繁殖

【問】：我想自己繁殖芙蓉，但不知其方法，請詳細指教。(臺南縣後壁鄉嘉於村一十八號邱玉香)

【答】：本省有芙蓉兩種，一是芙蓉菊，屬於菊科，為多年生草本植物。另一種是


木芙蓉，屬於錦葵科，是木本植物。你所指的不知是那一種。芙蓉菊可用播種繁殖，也可用扦插繁殖。播種在春季較宜，如數量不多時，最好播在花盆內，盆土要細，因為芙蓉種子很小，播種後覆土不宜太厚，只要將種子蓋上就好，然後覆蓋稻草，再行澆水，再行移植。扦插可在十一月至次年二月間行之。扦插在沙床內，其方法和其他可扦插繁殖的作物相同。至於木芙蓉，普通多用扦插繁殖，扦插的時期也是十一月至次年二月。

(謝靜芳)

好消息!! 豐年牌農藥

200萬元大贈獎

△凡購買豐年牌農藥
每滿七十五元者
即贈送豐年獎券一張。
△開獎日期請核對
八月十五日愛國獎券開獎
之號碼。



興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路 59 號
電話：5087.5088.5089 號

興農的優良種子

識，函索付郵二元即
寄。

不
行

電 豐 劇 電 話 : 原 機 九 三
話 原 鎌 儲 中 一
豐 原 山 金 七 一
原 北 四 二
一 路 二〇 二
〇 八 一 六 一
〇 之 八 三 〇
八 號 號 四

○各種日本、美國トマト種子

輸入：林興農行股份有限公司

◎美麗華盛頓五〇〇九號
美國 Burpee 公司製
裝之玻璃種子現貨供應
◎日本イモル交配
卷末ノ真夏ノ播種六十日穗甘藍

說明書備索

生産：日本タキイ種苗株式會社
總代理：茂生有限公司

臺北市南昌路二段六六號之二

• 全省各大種子行有售 •

的關係？地上有積稻草，冬天沒有洗澡，是否由此發生？
（每狗身上有生偏平的小蟲，如何處理？）
彰化縣二林鎮東勢里中路巷一號陳順根
【答】：（一）牛身上生出小粒狀物，是否蟲咬或其他原因引起，要經檢查後才可斷定，未診斷前，可向藥房買一瓶「松焦油」（ホーネル）不是松節油，在患部先行塗布，用碘酒加水一百倍，可能沒有效，大稀薄了，試用碘酒在患部塗布，但可能效果不大。
（二）「牛豬安」，可向獸醫藥品或飼料行購得，如是寄生蟲所致，用此藥有效。
（三）牛欄內要清潔乾燥，常換新鮮乾草。
（四）狗身上有偏平的小蟲，用 BHC、DDT、牛糞安等均有效。（黃立羣）

〔問〕：（一）黃牛在喉部下方，身體下部及陰莖包皮等處，生出小粒子，很堅硬，可能會癢，不知是何病？如何處理？（二）想用碘酒，加水一百倍把全身洗刷，是否有效？
〔三〕貴刊刊載「牛豬安」，何處有售，用此藥洗滌是否有效。

[問]：（一）黃牛在喉部下方，身體下部及陰莖包皮等處，生出小粒子，很堅硬，可能會癢，不知是何病？如何處理？

A simple line drawing of a rhinoceros in profile, facing left. It has a large body, a small tail, and two small ears.

母養猪營養好
米糠晒乾可久貯

【答】：(一)酵母之蛋白質很高，不均約四十分%，及含有豐富之維生素乙複合體，且對營養分之消化吸收有幫助，但因價格比其他蛋白質飼料稍貴，用量太多不經濟，普通小中豬可用十%，大豬使用五%就可。
(二)米糠因含有很水份，容易發霉及發霉，不容易貯藏，如擬貯藏應晒乾後貯藏較安全，經過充分曬乾的米糠，雖一部份之營養分(如維生素乙)會損失，但主要營養分不會損失，充分曬乾後的米糠，應貯藏於鐵籃(如油桶)並封蓋，就不易變壞，可以貯藏半年。(張聯欣)

A detailed black and white illustration of a pig's head and upper body. The pig is facing left, with its head turned slightly towards the viewer. It has a pinkish-red skin tone, a large dark eye, and a small ear visible. Its snout is slightly open, showing a pink tongue and nostrils. The illustration uses fine lines and shading to create a realistic texture for the pig's skin and features.

耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早穫種，發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍。

長岡
交配
初秋甘藍

高麗天菜候

新發明 最進口
安喜樂 Anthio
果樹特效藥 !!
紅蜘蛛・蚜蟲・介殼蟲
椿象・捲葉蟲的剋星！
瑞士山德士農藥廠 出品
東豐貿易股份有限公司
臺北市天水路15號 電話：44309 . 50945
大信 農藥
二化、三化螟蟲的剋星！
可殺蟲寶 乳劑
百聞不如一試 !!
其他各種農藥供應
大信農化工廠有限公司
臺北市天水路15號 電話：50945 . 44309