

農業信箱

茶油十二月播種

經一年後可移植

茶油，未知茶油種籽或種苗何處有售？何種土壤適宜，栽培法如何？（花蓮縣瑞穗鄉農會）

【答】：（一）目前省內似無專門栽培茶油樹之農友。

（二）種子於九、十月間可收穫，如需要可逕向北部農會接洽購買。

（三）粘壤土至沙壤土均可栽培。

（四）繁殖法可將九、十月間採收之種子，晒乾後於十二月間播種，約經二十天後發芽，於翌年十二月至後年一月間（經過二年）可移種。

（五）栽培行株距均為四公尺（十三臺尺），每十公畝栽植六十五棵。

（六）栽植後四、五年，每株可種子二十至四十公斤。（花蓮改良場）

【問】：北回歸線每年移動多少？現在之真正緯度多少？即在嘉義何地？（嘉義番路鄉內裡村瓦厝二號張喜詠）

【答】：北回歸線每年向南移動○.一六八秒，目前真正緯度尚未測得，惟據推算，現在北回歸線之真正位置，可能在現有標誌之南方約七百餘公尺處。（省氣象所）

臺東平地紅棗產量不高

【問】：（一）臺東鹿野鄉平地，可否栽培紅棗（藥用），不是印度大棗。

【答】：（一）紅棗苗臺灣有否？何處有售？產量若干？有否栽培價值？

（二）紅棗品種有幾？何時栽培，行株距多少？每分地種幾株？幾年可生產，何種肥料較適合？病蟲害防治法如何？（臺東陸蔭農場陳孝先）

【答】：（一）臺東平地栽培紅棗，雖能生長結果，但因氣候關係，生育不佳，難得正常之產量。

（二）紅棗苗中興大學園藝系有，但未大量繁殖，在臺灣尚無正式產量調查，銷路雖有，惟恐經濟上不合算。

（三）紅棗品種目前只有三種，栽培適期為十二月至二月間，行株距五公尺左右，宣期品種與土質氣候而異。每分地栽培三十株左右，其產量則視管理與地方環境而異，肥料仍需用有機肥料與化學肥料。棗也有食葉類害蟲，如「棗娥」等，可撒佈胃毒劑，棗之病害不多，如棗的「枯葉病」「斑點病」等可用波爾多液防治。（朱長志）

硫酸鎂・苦土石灰

兩種肥料性質不同

【問】：（一）硫酸鎂與苦土石灰在性質上

有何不同，兩者成分如何？苦土石灰可否與其他肥料如硫鎅、尿素、氯化鉀、過磷酸鈣等混合使用？

（二）骨粉據說是微礦性，可否與硫鎅、鉀肥等混合使用？（湖口郵政七四七信箱羅蒸靈）

【答】：（一）硫酸鎂為製鹽副產品，含有

不同），為一種中性水溶性速效肥料，適用於果樹、油脂作物、水稻、小麥及蔬菜等。

苦土石灰為製鐵、玻璃工業原料，其原石為

苦灰岩，以炭酸苦土石灰之形態存在，為一

後立刻施用，與氯化鉀可混合施用。但與硫鎅

混合後立刻施用為宜。（吳石生）

農藥登記證：

農藥字第〇三九八號

請用：

西德 K. D. Feddersen & Co.

榮譽出品 世界微毒殺蟲劑

加巴美
50% 可濕性粉劑
Carbamate
50% W.P.



經銷處：泰洋股份有限公司
臺北市重慶北路二段 108 號
電話：44994

東益貿易公司
臺北市天水路 2 號之 4
電話：43802

正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峯鄉草湖路 2 號
電話：霧峯 63

總代理：惠農股份有限公司
臺北市長安東路二段 16 號
電話：52093