

謹防破傷風



麟玉

四歲的男孩阿明，赤腳踏在一根發了銹的鐵釘上，他的媽媽立刻摘了一點草藥，嚼碎了糊在傷處，傷痕也就慢慢痊癒了。

過了半個月，阿明忽然生病。起先以為是受了感冒，立刻到藥房買些感冒藥給他吃，過了二、三日，阿明的病勢並沒有好轉，反而惡化，嘴巴也不能張開了（起初認為是不肯吃藥而不開的）。阿明的父母急得左右亂轉，趕忙送醫院醫治。醫師診斷是慢性的破傷風，打了一針破傷風血清及其他的針藥。經過二十多天的住院治療，才算痊癒。

破傷風是一種很可怕的病症，是由外傷而引起的外科特殊傳染病，分為急性與慢性二種。如是急性，外傷以後廿四小時，或在四天至十四天內，就會發作，死亡率很高。如是慢性，創口外表好了很久才會發作。破傷風發作的時候，首先外傷部份開始緊張，並感覺疲倦、頭昏痛、失眠、畏寒、發汗等現象。面部呈苦笑之樣。然後嘴巴慢慢不能張開，全身肌肉硬直，或間歇性痙攣。以後咽不下食物，嚥不下水，只能將湯汁類，

用湯匙沿嘴角灌入，使他慢慢吞下。患者起初熱度不高，但是到了快死的時候會發高熱。

破傷風桿菌多存於田野土壤、塵埃、人畜糞便內，其次是竹木、破瓦片以及銹鐵器上。當人體任何部份外傷的時候，創口都有被傳染的可能，較深的傷口更危險。預防的辦法，是預先注射破傷風預防針，每隔兩三年還要重新注射一次。

每個家庭必需準備碘酒、棉花、紗布，一旦皮膚受了傷，立刻塗上碘酒，用紗布包裹起來。不可敷草藥，以免引起傳染。如果傷口過深或過大，應馬上去看外科醫生，注射破傷風抗毒素，並聽從醫生的處理。

接受破傷風預防注射後，傳染的機會少，就是傳染的話，治癒的機會也多。

苦瓜嵌肉

材料：苦瓜三條、肉半斤、馬鈴薯一個、甘薯粉二匙、五香粉、胡椒粉、鹽等調味品少許。

做法：①苦瓜洗淨切成二段。馬鈴薯煮熟去皮切碎成泥，苦瓜去內部子仁，並削去內面的厚皮。

②肉切碎與馬鈴薯泥混合，然後把甘薯粉、五香、胡椒、鹽等混合，攪拌均勻。

③前項配料調好之後，即可塞進苦瓜腔洞內，裝入蒸籠，蒸約三十分至四十分鐘即熟。取出每段再切成數小片，吃時可沾辣醬或番茄醬。（李敏正）

華僑投資


全球企業股份有限公司



全球養雞完全飼料

保證您的雞長得

又「快」又「肥」



附設種雞場供應
美國最優秀之快
肥 (COBB) 肉雞

電話：四八二六
電話：八二〇六
電話：三三〇一

公司：臺北市南京路一段一〇五號
工廠：桃園縣大鄉村中正路廿二號