

稻種農早一號 栽培法如陸稻

【問】：記得過去豐年刊載過臺灣有農早一號陸稻，可適合缺水地區栽培，未知此品種那裏可買得到，栽培方法如何？（彰化縣溪州鄉舊村厝後巷三號陳恒山）

【答】：農早一號，原來為陸稻品種，可在旱地以陸稻栽培，其栽培可按照普通陸稻之栽培時期及整地法播種。致其肥料用量等，可按照溪州鄉之土壤肥度，比照蓬萊稻之數量施用。種子可試向農業試驗所農藝系洽讓。（林克明）

鎂肥可作追肥

【問】：氯化鎂與碳酸鎂是否鎂肥，可否施於稻田，何處有售？價錢多少？每甲地施用多少？如何施用？可混合其他肥料否？（苗栗三灣鄉三灣村一八〇號陳清波）

【答】：目前市面所含鎂肥料很多，主要為碳酸鎂或硫酸鎂，氯化鎂不是。可向新竹市建興街廿一號「非豐企業公司」，或東勢鎮北興里豐勢路二七五號，或員林鎮靜修路廿三號等處購到。每公升價格約二·五—三元，每甲地可施用二百公升—三百，如性肥料混合，分次作追肥施用。（吳石生）

阿特靈後立即種甘藷

蟋蟀多地應一週後種植

【問】：一種甘藷前為防治象鼻蟲（臭香蟲），要噴射四十多「阿特靈」，需等一星期後才開始播種，實際上有困難，因等一星期後在缺水區土壤過乾，甘藷苗不易成活，如噴射後一天播種，有何不良影響？

【答】：甘藷苗需浸二十五% DDT 稀釋液一二分鐘，而後用手拿着苗播種，皮膚與藥液會接觸，是否會中毒？有何方法防止？（高雄路竹鄉下坑村九五號王順天）

【答】：（一）為防治甘藷地下害蟲，施用「阿特靈」後，並無嚴格限定須隔一星期才可播種甘藷苗，因甘藷地下害蟲主要為象鼻蟲、猿葉蟲及蟬蟴等，但如蟋蟀類發生較多地區，施藥後如隔一星期，蟋蟀類被毒死

後播種，可避免其為害播種後之甘藷苗。故如無蟋蟀類發生地區，施藥後立即播種，並無不良影響。

【問】：甘藷苗浸漬二十五% DDT 一百倍液後，可毒殺附在苗上之害蟲，經浸藥之苗，最好待除乾後再行播種，或於播種前一天浸苗，待除乾後再播種，可減少藥液粘濕皮膚。（張良傳）



注意灌水適時

防止橡果裂果

【問】：我們所栽種的懷特種橡果，在結果初期果實表皮很好，但每當到了快成熟時，請問這是何原因？有何方法防治？（臺南佳里鎮中山路二五〇號高文宗）

【答】：因為芒果接近成熟時，適逢南部雨季，土壤由乾忽而轉濕，果實內部組織因水份突然增多，果皮容易裂開，故不使土壤過乾之時灌水，或設法保持土壤適量濕度，提早採收等加以防治。（王兆全）

木瓜乳的採收及加工

【問】：木瓜乳如何採收？採收後如何加工？（士林鎮大北路五十號陳琮賢）

【答】：木瓜酵素為一種蛋白質分解酵素，採自未成熟的青色木瓜果實的乳汁。其方法普通是用一種簡單的竹片刀（竹片做成之尖刀），將木瓜的皮部割破深約一公厘，用磁器或玻璃杯收集從傷口流出的白色木瓜乳液，經加工乾燥而成。

採取木瓜酵素，宜在早晨乳液較多時行之，尤其是剛下過雨的次晨最佳。木瓜乳液因為很容易凝固，所以加工時，普通是放在淺玻璃杯或磁製皿中，使其迅速乾燥就可。大部分在產地原場可用日光乾燥，但如用人工乾燥時，則多採用真空乾燥機，或專用烘乾酵素用之乾燥機，等充分乾燥後，再用真空磨碎機磨成粉，然後貯藏於無空氣的真空中。其成品大部分供製藥，化粧品及化學用較多，售價相當貴。（高雄鳳山鎮大裕產業公司朱仙利）

防治水稻紋枯病

請用!!

本年度農林廳

最新推廣藥劑

臺灣省農林廳農藥登記農藥字第 381 號
審定商標中臺字第 19124 號
聯合商標註冊號數字第 9724 號

アソジン®

液劑 (新阿蘇仁液劑)

アソジン®

水和劑 (阿蘇仁水和劑)

現貨供應

- ▲製造元：日本イハラ農藥株式會社
- ▲總代理：臺灣庵原農藥股份有限公司
- ▲進口商：靜興企業有限公司

- (ネオアソジン液劑) 年豐農藥行 翁博鈿
嘉義縣義竹鄉六桂村 199 號 電話：義竹局 24 號
- (アソジン水和劑) 正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峰鄉草鄉湖路 2 號 電話：63 號