

日本荔枝栽培法

和四季荔枝不同

【問】：(一)日本荔枝與四季荔枝的栽培法是否相同？

(二)栽培後幾天收穫？

(三)如何施肥才不會影響分枝？

(四)園地之乾濕是否重要？

(五)收穫期間多久？

(六)速效肥與人糞尿是否都可用。(桃園縣觀音鄉埔坪村五八號邱欽源)

【答】：(一)日本荔枝與四季荔枝在栽培上完全不相同。日本荔枝須播種育苗，然後以株距八—九公分單株栽培；四季荔枝以二、三株種在一起，株距二十一—三十公分。

(二)日本荔枝定植時須開七十五—九十公分寬之行溝，溝深約二十四—三十公分。四季荔枝定植時，只開淺溝即可，行距二十一—三十公分。日本荔枝分蘗少，四季荔枝分蘗多，定植至收穫期，日本荔枝約需一百—一百二十天；四季荔枝約需五十一—六十天。日本荔枝分三次培土，四季荔枝於收穫前二星期培土，軟化葉鞘部即可。

(三)四季荔枝分蘗數多者為佳，日本荔枝分蘗多少，與品種有關與施肥時期關係不大。外國地應保持五十一—五十五%之適當水分，最忌過乾過濕。

(四)收穫期間日本荔枝約半個月，分次採收，採收期間與栽培面積有關，四季荔枝約七十天。

(五)人糞尿及尿素均為良好的氮肥。(王進生)

梧桐修剪注意枝徑高度

【問】：梧桐樹林為減少風害，擬於休眠期剪枝，但不知應如何修剪為佳？(花蓮縣光復鄉大富村一三七號李阿輝)

【答】：本省所指梧桐似是「九重桐」，該樹萌芽力甚強，栽植後如幹形發育不良，可在翌春萌芽前或當年秋季落葉後，自根上七公分處切斷，使其重新萌芽，若萌芽株數太多，應留較良者一株，餘均摘除，促其

生長，此處理若在秋季施行，恐受凍害，故冬期可覆土於切株上，至翌春發芽前將土除去。

因栽植泡桐之目的係為收穫其幹材，故幹形通直無節為佳，近年日本東大為增高枝下高起見，有施用植物生長素「奇爾靈」作試驗，並多施行摘腋芽或打枝(剪枝)等工作，如此可獲得優良之幹材，摘腋芽之高度，最少要在二公尺以上之處，打枝應在其枝徑，未達五公分時行之。

對於防備風害，可用耐風樹種，栽植於泡桐林地之周圍，作為防風林，以利保護，又如混植耐風樹種，亦係一個方法。(康何經出)



樟樹消耗地力必須注意施肥

【問】：芳樟目的在採收枝葉，肥料三要素應如何配合？

年齡對三要素需要量如何增減？定植後須經多少期間才可施肥？(新竹市振興里新興三八號張光輝)

【答】：一般造林經營較為粗放，在栽植後肥培者甚少。但對芳樟林施肥之配合，可參照日本東京大學教授芝本武夫所稱：「潤葉樹栽植後當年施肥基本量，每株須肥十四公分，磷肥七—八公分，鉀肥五—八公分。(有關芳樟之品種改良及施肥量等，林務局已在試驗)。芳樟林因每年須反覆採取枝葉，樹木本身無法繁茂，而且林地並無落葉可資恢復地力，因此林地如不設法施肥補給養分，林木將逐年衰弱，又容易發生病蟲害，終告枯死。

施肥在栽植時應施基肥，成活後才可施追肥，以後每年可施肥一次，四至九月間均可，用量以前述基本量為準，施肥與樹齡有關，可照桑園管理方法，應在發芽前施行，休眠期施肥效果不大。

最後該項林地因消耗地力甚大，不但需要肥培，尚且須要設平台階段，防止表土流失，以利水土保持。(康何經出)

農藥成份標準 保證品質優良



現貨供應



巴拉松乳劑

馬拉松乳劑

PM乳劑

DDT乳劑

安特靈乳劑

靈丹乳劑

地特靈乳劑

魚藤精乳劑

利我農乳劑

速克丹乳劑

各地農藥零售商均有發售

中農化工廠股份有限公司

總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660.28895 工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154