

每甲約放六萬至八萬尾，約十天後再放經蓄養之草蝦大苗，每甲約三千至五千尾，接着再放虱目魚新苗，每甲約三千尾。由於蝦在魚塢中死亡率頗高，所以一般漁民多在蝦苗便宜時多放些，昂貴時少放些。

放養時間視天氣而定，悶熱時及大雨之後不宜放養，天晴日暖時，在上午八點至十點時放養蝦苗較為適當，放養時池水鹽分最好在十分之三左右。

初 放養的蝦苗，大都攝食池中天然餌料，長大後則需經常投給餌料，幼時飼以搗碎螺肉，稍大則投以雜魚花生粕豆餅米糠等。花生粕豆餅及米糠，既可直接作為飼料，吃剩的又可作培養底藻之肥料，但仍以適量為佳，以防底質變臭。投用花生粕時，將其切成小塊，投入池中，蝦類即可聚集攝食。以米糠作餌料時，則應先將其磨入米籾或大型鐵器中，加入少許池水攪拌後，由竹排運至池中投入，以防浮於水面或被風吹散損失。

蝦 類略為成長後，天氣晴明時，每甲每次投餌約米糠六十至一百斤，視蝦體大小及密度而定，每天投一次，每隔四、五天停餌一兩天，視水色變化而定。虱目魚多在白天攝食，而蝦類則白天潛伏泥砂間，晚間出而活動攝食，所以，蝦的投餌，應在下午五點或黃昏以後，為保持水清起見，通常施用水肥，每天數磨即可。



草蝦在混養鹹水魚塢中的生長情形，大致放養後一個月，體長可達九至十公分，約六個月後，體長可達十二至十四公分，體重可達三十公分。草蝦單養投用雜魚時，則六個月平均可達體長十八公分，體重七十四公分。

(水試所鹿港工作站資料)。混養砂蝦放養後經四十至五十天即可收穫，此時每斤在一百五十至二百尾之間。第一批放養的砂蝦可在六月下旬開始收穫，陸續將大的收穫，且不論大小，盡量在八月底前收穫，否則多將死亡。九月間排乾池水，晒底兩三天，未收穫的魚蝦則納入深溝內，晒完放入新水，再放養第二批砂蝦苗。

第 二放養率為每甲約七萬尾，約在十一月左右即可收穫。蝦類成長後應行中間捕撈，每天陸續收成。其捕撈方法，係以螺肉作誘餌，並加以標誌，一甲之池可選投數處，但彼此間應有相當距離，以免當此處捕撈時而驚動他處之蝦。螺肉投放約半小時，草蝦必集中攝食，此時用投網捕之，此法多作為捕草蝦之用。砂蝦則當雨天時，因池水較淡，蝦在池中驚惶跳躍，此時在水門處裝以袋網，打開水門，施行排水，蝦必自投羅網。在結束清池總收穫時，池中留下的蝦，則可用手捕起。小港近年多採用活動竹籬，在池之深溝設定置陷阱捕蝦，據說此法簡便有效，且不損傷蝦體，所以售價也高。

收 獲時蝦的體型，因收穫時間，放養率及管理不同而異，普通草蝦大者每斤約十尾，小者則約十六尾，砂蝦則經放養二個月者每斤約一百五十至二百尾，三個月則每斤約一百二十至一百五十尾，四個月每斤約六十五至一百尾。

市價草蝦每斤約五十至八十元，砂蝦約二十至四十元。蝦類的收穫率，視水質、氣候、管理而定，如各項良好，小港地區草蝦收穫率可達百分之五十至六十，砂蝦達百分之六十左右。



最可靠有信用的 DDVP 乳劑。
為照顧全省民衆食用蔬菜、水果的安全、推薦農友，採用本藥劑防治蔬菜、茶、水果害蟲。

日農 DDVP 乳劑

日農滴滴微乳劑

農林廳農藥登記證第274號

包裝：100c.c. 500c.c.

防治範圍：

蔬菜：青蟲、夜盜蟲、小菜蛾、菜螟蟲、蚜蟲。

油菜：蚜蟲（龜蠅）

柑桔：紅蜘蛛、蚜蟲、椿象、介殼蟲類。

洋菇：消毒菇末、防治跳蟲、菇蠅等。

特點：本劑係速效性藥劑，因具有急速分解之特性，故對於需要毒性消失快速之蔬菜、茶、水果等作物，用於收穫三、四天前的撒佈最為適當又安全。

進口現貨供應 泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路2段108號

電話：44994

製造廠 日本農藥株式會社

東京・大阪