

不易觀察，往往上當，倘能向較著信譽的養蠶者購買，較為可靠。

種蠶的飼料，以雜魚為主，並可兼用田螺、蠶蛹、蝦、蟹、泥鰱、蝸牛、蜆上等。餌料宜放木製投餌台的鉛絲網上。（圖四中的平面圖所示）或因蠶慣於夜行索食，餌料放在盆形籃內，傍晚時垂吊池底，餵它亦可。但餌料投量的多少，應依攝食情形而定，剩料殘渣，要常清理，否則，任它堆積腐敗，水質變惡，易致疾病。又每年十一月至翌年三月間，溫度降低，攝餌很少或暫停索食而進入冬眠狀態。

雌雄種蠶配放的比例，目前還沒有確定的標準，一般是雌多於雄，可減少交尾期中雄蠶的爭鬥，並能降低繁殖成本，但有主張雄比雌多，使受精率提高。本省蠶的產卵期，為三月至十月，以六、七月為盛期。當水溫達二十度以上，雌雄開始交配。傍晚或清晨雌蠶從水裏爬上產卵場，用四肢挖一漏斗狀的孔穴，直徑約十七公分，深二十公分，在內產卵，再以沙土覆蓋，回到水中。

取卵小心孵化


產卵次數，和現場環境、餌料及雌蠶年齡等有關，一年中，可產二次至五次，每次產卵數，亦隨雌蠶體型大小而異，約產十個至三十個。卵形正圓，直徑二公分，有精的卵，在產後兩小時，從殼的頂端，現出圓形的白點，漸次擴大到赤道，可能是卵的初期分裂，發育至胚，而協助胚的呼吸作用所生的通氣孔，又稱氣室，無精卵在殼上，看不到白化。

產卵場，必需經常巡視，如發現

蠶的足跡時，即可謹慎地將沙土慢慢撥開，檢出產卵，移往孵化場，擇有精的，把氣室即卵的頂端向上，萬一倒放就無效。輕輕的埋放已掘好的沙穴中，深約十五至二十公分，無精的卵則除，如同放一起，將來一定發生腐敗，影響其他健全的卵。

有精卵在砂溫攝氏二十五度至三十度，約經四十五天至六十天，即孵出稚蠶。孵化率的高低，和現場設備有關，而溫度、濕度的激變，更能直接影響。普通四月至七月所產的卵，孵化率較高，八月以後產的卵，因溫度漸低，而生出的稚蠶，體質亦弱，較難越冬。

蠶卵的天然孵化，由於因素複雜，對孵化率的高低，控制較難。農友們，如你經營的事業，已有相當規模



圖面側池卵產兼養飼蠶種：三 國



大王牌

最新柑桔果樹強力綜合殺蟲劑 保證原封裝

KING DIMETHOATE

E.C.

日名：キング ジメトエート 乳劑

柑桔果樹之蟲害防治請使用

有效・安全・低毒・經濟・省工のキング ジメトエート乳劑

柑桔適用害蟲（請參照農林廳54年度推廣手冊61甲、62乙、63丙頁）

種	類	舉	例	濃	度	備	註
有殼介殼蟲	介殼蟲	黑點介殼蟲、褐點介殼蟲等		1.000—1.500	倍	同時可防治蚜蟲、粉介殼蟲、紅蜘蛛等	
無殼介殼蟲	介殼蟲	綠介殼蟲、半圓介殼蟲等		800—1.200	倍	同時可防治有殼介殼蟲、木蝨、酒葉蛾等	
粉介殼蟲	介殼蟲	球粉介殼蟲、桔粉介殼蟲等		1.000—1.500	倍	同時可防治有殼介殼蟲類、木蝨、粉蟲等	
蚜蟲	介殼蟲	捲葉蚜、大桔蚜、小桔蚜等		1.000—1.500	倍	同時可防治其他害蟲	
木蝨	粉	刺粉蝨、大蝨		1.000—1.500	倍	同時可防治其他害蟲	
潛蛾	蛾	潛蛾		1.000—1.500	倍	同時可防治紅蜘蛛	
紅蜘蛛	蜘蛛	紅蜘蛛		800—1.200	倍	同時可防治其他害蟲	
其他	其他	長壁介殼蟲、角肩椿象、綠椿象		800—1.200	倍	同時可防治其他害蟲	

製造元：キング除蟲菊工業株式會社

總代理：英達貿易有限公司

臺北市華陰街39號 電話：46980

現貨供應：源豐農藥行

臺中縣東勢鎮豐勢路146號