


和手，放入水中，蟹因感到所咬的東西不震動，會把口放鬆而逃走。倘需全部捕獲，即將池水排乾，由池的一角，順序挖提潛入土中的蟹。

成蟹的運搬，距離近而數量少的，用草袋盛裝，放些細沙，再以大針縫好。如氣候炎熱，運時可常灑水，以保持濕度，就不會死。路程遠的，要用木箱，內分數層，各層鋪以濕的細沙，將蟹放在沙上，並放些小蝦、水草、青菜等，供蟹途中食用，且可減少擦傷和互鬥。

蟹的宰殺方法，是先抓緊蟹的後端，用布條或棉繩，接近它的鼻端，引誘蟹咬緊不放，再用力一拉，使它的頸伸長，就用菜刀切斷，並提高後甲，使血液滴入容器內。然後把蟹體放入熱湯中，浸兩分鐘，用手指剝去防體表面革狀的皮，再把刀插入背腹甲之間，割開甲殼，取出內臟。當割除膽囊、膀胱和腸的內容物時，應特別細

心，以免破損漏出而影響肉的美味。最後，連皮帶骨及內臟，分切適當大小，隨各人所欲烹製各種菜餚食用。

* * *



池化膠卵蟹：五圖

三果·壽·介

△介壽果(腰果) 原產中南美洲熱帶，約四百年前哥倫布發現新大陸後不久，由葡萄牙航海人員或傳教士，携至亞非兩洲熱帶地區，廣為繁殖。現在出產最多的國家，為印度和葡屬東非洲，坦干尼加、怯尼亞。此外馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼、錫蘭等國，也出產很多。

△臺灣的介壽果，在一九三二年，由日人清田清氏自塞班島携來種子試種於嘉義縣竹崎鄉清田農園。一九三四年由泰國輸入苗木試種於彰化縣員林區二水鄉。後者因管理未周，致全數枯死。一九四一年，嘉義農試分所由竹崎鄉清田農園取得種苗，試種二十餘株，據說生育良好。(康瀚)



水稻、大豆、蔬菜
香蕉、棉花、果樹

諸害蟲請用

農林廳登記
農藥字第 497 號

剋百蟲 可濕性殺蟲劑

CARBARYL 50 (DICARBAM)



青山貿易有限公司 本公司：臺北市松江路61號 電話：41144 現貨供應

中興農產行 漢湖鎮員寬路40號 電話：248
和輪農藥行 苗栗鎮中正路52號 電話：167