

製話梅色素用紫蘇葉

【問】：(一)話梅所需的佐料有幾種？
(二)梅子與佐料比率如何？與氣候有關係否？多少日數才能做成？(嘉義中埔林試所中埔分所方萬榮)

【答】：(一)所需佐料為食鹽和色素兩種。

(二)佐料配合比例為原料梅十公斤，配合鹽二·五公斤，紫蘇葉〇·六公斤(或用無害色素二十公分)。一般話梅鹽分很高，可視貯藏及嗜好酌量增減。紫蘇葉為一種紅色素原料，先以水洗後用少量鹽摩揉，除去多餘的苦青汁，才宜使用。

(三)與氣候沒什麼關係。

(四)約一個月可製成(朱仙和)

經營果園兼養豬

多角方式很有利

【問】：(一)我在高縣仁武經營山地，種植果樹，已全部造平台階段水土保持，並計劃多角經營兼養豬，是否可行？

(二)平台階段的合壁，欲種植豬喜食的牧草，不知以何種最適當？種子何處能購到？

(三)如種菜花豆牧草是否適當？(高雄市鹽埕區大義街一號李銘潤)

【答】：(一)台端經營之果園，擬進行多角經營兼養豬之觀念極為正確。

(二)養豬宜直接綜合養豬方法，向屏東縣農會購買半混合飼料，並配合自產飼料。利用其糞便，極有利於果樹。

(三)養豬青飼料作物可用下列品種：台壁：①山珠豆(種子可向嘉義縣農會購買，種植前要浸七十度熱水二分種)②賽芻豆，目前無大量種子供應。果樹下：①砂土用營多藤，可先以種子播種，後扦插繁殖。②較粘性土，可用筆花豆(即泰樂豆)，目前尚無種子供應。請向臺南縣新化鎮省畜試所洽苗扦插試種。(黃嘉)

荔枝苗不成活

根部分發育有關

【問】：我於三箇月前栽種荔枝，植後兩箇月間發育良好，但至三月後葉忽然枯黃，連根發黑，不久就繼續枯死，未知何故？

今將受病之葉及根寄上，請鑑定。(李煜煌)

【答】：寄來葉片標本，自葉尖至葉緣有燒灼現象，主要原因有二：一為土壤水溶液濃度過大(如施肥過多等)，引起反滲透作用，使葉片乾枯；一為風力過大，嫩葉失水過多，根部吸收水分供應不及，也可使葉片發生燒灼現象。另一種是新植苗成活後再枯死，則與壓條苗之根部有關，凡壓條苗留在樹上過久，並經過長久乾燥時期剪下，太多數根已乾死，種植後，雖暫時成活，但待新葉發生至相當數量時，由於嫩葉失水超過少數根所吸收的水分，常使幼苗枯死。(張振甫)

柑桔剪除新芽要注意！

【問】：(一)我種柑桔滿二年三個月，高約三尺半，一尺以下側芽很多，可以剪除否？

(二)有一側芽生長很快，可以剪除否？

(三)現在可以剪除嗎？或幾月份最好？(臺北雙溪鄉牡丹村三五號陳俊德)

【答】：(一)若樹形已整妥，原則上在枝幹基部萌出的新芽是可剪去的，但主枝過高或樹勢旺盛而主枝數過少時，可留基部一尺左右的較強壯枝條一、二枝作為主枝，而剪去其餘枝條。

(二)由主幹上面(向日面)萌出之新芽勢較旺盛，樹液充足，宜留此種芽。

(三)新芽之一次剪光辦法，易使根部腐爛，須留意。

四不必剪新芽之剪除工作，該在新芽萌出直後，若時期延遲時，就要等新芽硬化後才可剪除工作。(翁仁祿)

北部種香蕉

一至四月較宜

【問】：在北部地區種香蕉，何品種及何時種植較適合？(桃園縣平鎮鄉宋屋村一八九號之二郎陵)

【答】：本省北部適宜栽培之香蕉品種有仙人蕉、矮脚蕉等，惟矮脚蕉產量少，未達普遍化。種植適期為一、四月，在此期間種植者，當年之颱風期因植株尚小，可避免嚴重風害，而可在第二年颱風期以前收穫。(翁仁祿)

防治水稻紋枯病

請用!!

本年度農林廳

最新推廣藥劑

臺灣省農林廳農藥登記農藥字第 381 號
審定商標中臺字第 19124 號
聯合商標註冊號數字第 9724 號

アソジン®

液劑 (新阿蘇仁液劑)

アソジン®

水和劑 (阿蘇仁水和劑)

現貨供應

▲製造元：日本イハラ農藥株式會社

▲總代理：臺灣庵原農藥股份有限公司

▲進口商：靜興企業有限公司

(ネオアソジン液劑) 年豐農藥行 翁博鈞
嘉義縣義竹鄉大桂村 199 號 電話：義竹局 24 號

(アソジン水和劑) 正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峰鄉草寮湖路 2 號 電話：63 號