

### 紐西蘭兔種不適剪毛出售

【問】(一)安哥拉兔出生後何時可配種？  
 (二)兔毛何處有人收購？  
 (三)紐西蘭白兔是否可剪毛出售？(彰化溪湖鎮媽祖廟里九八號陳宗顯)

【答】：(一)安哥拉兔生後約七、八個月即可繁殖，一年繁殖四、五次，每次約生小兔五、六隻不等。  
 (二)安哥拉兔毛，目前量少，收購的人不多，如有大量生產，每年有五十萬磅生產，日本可能向臺灣收購。  
 (三)紐西蘭兔是毛皮肉兼用種，不可剪毛。(黃立群)

### 何謂「賊風」「自家中毒」？

【問】：(一)在農業要覽獸醫輯內有不解的名詞，請解釋何謂「賊風」？「自家中毒」？「出血性敗血病」？「敗血病」？  
 (二)以煎餅餅來餵豬是否比大豆餅好？  
 (三)米糠餅與以米脫脂的好或脫脂的好？  
 (四)據說中豬前便未脫脂的米糠，會使豬的腸仔變小，致生長緩慢，是否事實？(嘉義水上鄉巷口村六三號陳德祿)

【答】：(一)所謂「賊風」，係指冬季季節風期，畜舍防風設備不完全，而由間隙吹進來之寒冷風。「自家中毒」是指中毒原因及毒物不是外來者，而在畜體內發生毒物引起中毒，例如腎臟炎不能排泄新陳代謝產生之分解物，致使毒質積於體內，因之發生尿毒症，或消化管內之異常腐敗引起之中毒，概屬自家中毒。「出血性敗血病」及「敗血症」，是由屬於敗血症或由血性敗血症引起之急性疾病，此種疾病內臟各臟器伴有出血性炎症，患畜血液內充滿病原菌及毒素，是一種嚴重之全身感染病。  
 (二)大豆餅之營養比亞麻餅好，且亞麻仁餅用過量，脂肪會軟化。  
 (三)脫脂米糠之成份高，生米糠之粗蛋白質為一四、五%，而脫脂米糠為一七、五%。小豬時米糠不應給與太多，否則影響發育是事實。(張聯欣)

### 養鴿飼料的配合

【問】：(一)請問鴿子的雌雄如何鑑別？  
 (二)小鴿子要養幾個月才可生蛋？  
 (三)鴿子的飼料以何者為佳？  
 (四)用飯加米糠攪拌是否可以。(苗栗苑裡鎮苑港里二鄰六號陳象)

【答】：(一)鴿子的雌雄，在未達性成熟期(雄鴿開始追逐雌鴿求偶)頗難區別。一般來說，雌鴿較小而細嫩，尤以頭及頸部為然。雄鴿較雄壯，鳴聲洪大，尾常拖曳於地，故雌鴿與地面較呈水平。  
 (二)幼鴿開始產卵時間，視情形自五個月至八個月不等。  
 (三)鴿的飼料不用粉料，青飼料亦不需要，最好的飼料所含養分為蛋白質十三、五—十五%，碳水化合物六十一、七十%，脂肪二—五%，纖維五%。飼料中以黃色玉米、稻穀、小麥、燕麥及豆類等常用為佳，另外補充些礦物質飼料。  
 (四)米飯與米糠混和可以餵鴿，但要注意養分不夠，及其是否喜食等(李培元)

### 「杜洛克」配「桃園種」後代可再配「藍瑞斯」公豬

【問】：(一)杜洛克公豬配桃園種，所生下的仔豬毛色有黑紅兩色，現在發育情形很好，留起來做種豬是否可以？  
 (二)要配那種公豬較適合？  
 (三)如再配杜洛克的公豬，如用同母豬所生的種豬是否可行？  
 (四)以後所生仔豬毛色及發育情形如何？(彰化大村鄉官旗村一巷一號賴雅音)

【答】：(一)杜洛克公豬配桃園種所生之一代雜種，可以留做母豬。  
 (二)此種一代雜種，宜配藍瑞斯公豬。  
 (三)此種一代母豬如擬再配杜洛克，應選遠親血統公豬。但以配藍瑞斯為上策。  
 (四)配藍瑞斯所生之仔豬，毛色全白，或時有黑斑。如配杜洛克，其仔豬為棕色或深棕條紋。(張聯欣)

## 長岡交配 初秋甘藍 全天候高麗菜

耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早穫種，發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍，外銷最受歡迎，價格最高之甘藍。

「說明書備索」

生產：日本タキイ種苗株式會社  
 總代理：茂生有限公司  
 臺北市南昌路二段六六號之二  
 電話：二三八〇一八六二四五一〇

• 全省各大種子行有售 •

新貨已到

即請購用



鷄白痢的特效藥「福利來」為供應新雞育成的成功特別實行八折大優待。  
 每罐一筒月祇花八角藥費，保證百發百成，既可安心又可獲利。  
 「說明書備索」

各地飼料行均售

享譽已久 公認的效力

Furella 'フレラ'

總代理：英商卜內門洋碱有限公司  
 臺北市中正路一八〇〇號  
 經銷處：國際藥廠  
 臺北市長安東路一段三九號