



水稻發育太茂盛  
減少灌水防病蟲

【問】：我有四分餘水稻嘉南八號，於國曆二月十三日插植，插植前施下很多基肥，每株株數為五、九支不等，至今每株支數約四十多支很大犧，恐怕以後結穗小及有效穗亦可能少。故請問有何補救方法。（彰化竹塘鄉溪墘河陽路二〇號益民）

【答】：（每株分蘖數達四十餘支，似有過多之嫌，其中無效分蘖可能不少，但現在已減有效分蘖期過久無法再抑制分蘖？）據稱於二月十三日插秧，現在應該已經抽穗開花了，施肥也無從施用，如果剛抽穗齊時，視稻葉顏色如不太濃者，可以使用尿素每公頃三十公斤以下，作為粒肥促進谷粒稔實。

（二）不可過量之灌溉以防莖葉繁茂而引起倒伏。  
（四）因分蘖多田間通風不佳，需特別注意病蟲害發生，尤其紋枯病及浮塵子等，應澈底防治。（林克明）

二期秧田不必蓋草木灰

甘藷苗以塊根繁殖較好

【問】：（一期稻作秧苗覆蓋燒土草木灰等會使秧苗健旺，而且耐寒，請問二期作秧苗，何者產量高？）  
（二）大豆在新竹地區秋作，有三國種及臺農二號，那種產量高？臺農二號種子那裡有售？（竹市鄉中興村一九號劉阿榜）

【答】：（一期作秧苗期為四十五天，二期作秧苗期為十五天，因期間短，無需蓋燒土草木灰等，否則會增加溫度，可能多發生馬鹿苗病。）

（二）年年採用由本圃直接採苗繁殖種植者，其生理漸漸變劣，病害蔓延，結果小諸增多，產品減少。據嘉義農試驗所試驗報告，約減產百分之十。

四。

（三）國大豆生育日數為一百二十天，每公頃產量二千—三千公斤，臺農二號生育日數為一百二十五天，每公頃產量一千五百—三千公斤。臺農二號較具抗酸及抗鹼性土壤，種子粒大。目前種子甚少，尚在繁殖中。（洪再傳）

西螺可種臺南一號水稻

密植增肥可以增加產量

【問】：（西螺地區，蓬萊水稻，第一二期作，以何種最有抗病力？收穫最高？

（二）據稱於二月十三日插秧，現在應該已經抽穗開花了，施肥也無從施用，如果剛抽穗齊時，視稻葉顏色如不太濃者，可以使用尿素每公頃三十公斤以下，作為粒肥促進谷粒稔實。

（三）不可過量之灌溉以防莖葉繁茂而引起倒伏。

（四）因分蘖多田間通風不佳，需特別注意病蟲害發生，尤其紋枯病及浮塵子等，應澈底防治。（林克明）

（五）一期秧田不必蓋草木灰

（六）甘藷苗以塊根繁殖較好

（七）在臺南地區行株距以行距八寸，株距五寸，每株播四—五支苗最適。

（八）密植增肥可增收，在臺南區密植增肥示範結果，密植增肥區（行距八寸，株距五寸），每公頃施肥量氮一百公斤，磷五十公斤，鉀四十公斤，第一期作增收十二—六%，第二期作增收十—四%。（莊商路）

好速

ORTHO

農藥

大模蟲乳劑  
Dibrom 8 Emulsive

富賜靈乳劑  
Phosdrin 2 Emulsive

福爾丹水和性粉劑  
Phaltan 50 Wettable

殺蠅牛劑  
Bug-Geta Meal Form

好速殺水和性粉劑  
Orthocide 50 Wettable

地特靈乳劑  
Dieldrin 1.5 Emulsive

製造廠 California Chemical Company  
ORTHO Division U. S. A.

經銷處：泰洋股份有限公司  
東益貿易公司  
正豐化學公司  
總代理：惠農股份有限公司

請用

世界微毒殺蟲劑

加巴美  
50% 可濕性粉劑  
Carbamate  
50% W.P.

防治：水稻、柑桔、鳳梨  
蔬菜一切蟲害

製造廠 K.D. Feddersen & Co.  
West Germany

臺北市重慶北路二段108號  
臺北市天水路2號之4  
臺中縣霧峰鄉草湖路2號  
臺北市長安東路二段16號

電 話：44994  
電 話：43802  
電 話：霧峰63  
電 話：52093