

鳳梨那些病蟲害？

瑞 榮 黃

萎凋病

(俗稱露筋病)

本省鳳梨栽培面積，近年來急速增加，同時，病蟲害的發生，也逐漸嚴重。鳳梨的病蟲害，約有數十種，茲將各栽培地常發現的種類說明如下，以供果農們參考。

本病是鳳梨病害中發生最多，且很嚴重的一種，有鳳梨栽培的地方，均有此病侵害。此病的病徵：起初葉部變色，或葉片中表現綠點，即失去深綠色，漸次變為黃色，依葉先端軟化柔軟下垂，最後全枝萎凋或枯死，根部也腐敗，所以容易誤認為旱害或根腐病。

此病是由鳳梨粉介殼蟲侵害而發生傳播的，此種介殼蟲，不但侵害植株，同時也會寄生果實侵害。

防治方法：①驅除鳳梨粉介殼蟲；自無粉介殼蟲之圃場選採健全種苗，種植前一定施行浸藥（富粒多或馬拉松各二千倍液浸三分鐘）消毒，種植後每經二至三個月施用同樣藥劑，每株灌注一百公撮。②粉介殼蟲多由蟻蟻移動保護而傳播，必需撲滅園中的蟻蟻（用阿特靈一百至二百倍液散布園中）。③注意肥培管理，育成健全植株，耐病性較強。④連作地老株

應儘量整除，撲滅有害昆蟲。

根腐病

本病也是鳳梨嚴重病害的一種，在本省各鳳梨栽培地都可以看到。尤以排水不良地、粘質土壤地，或者雨期多濕、土地旱裂等時發生較多。起初根部腐敗，葉部變赤黃色植株萎縮枯死。本省南部地區在乾燥期（冬季）萎縮被害者特別多。最好選擇排水良好，冬季不早裂的土地，注意肥培管理，覆蓋週到，能使植株生育旺盛，對本病防治最為重要。

心腐病

通常在種植活著到開花前侵害植株，初期病徵心葉變色，呈黃色或帶紅淡褐色，然後從莖部和葉部到葉端相繼腐爛。腐爛時最初呈水濕狀，後來變作黃褐色，在發病和健部部分具一暗褐色線紋，最後心部全部軟腐、發臭，傳播很快。被害株拔去後重新補植，也不容易成活。在平地或排水不良的地區，心腐病最為猖獗。

防治法：栽培地如為平地，宜首先注意排水，種植前切勿使外面的水流入栽培行間，或做高畦。補植苗事先應用波爾多液浸漬消毒，或把土壤挖鬆給太陽充分照曬消毒。

苗腐病

苗腐病通常在種苗種植到成活之間發生，如果使用乾燥不良種苗或整地不良、排水不良時發生最多。一般由苗株基部或心部腐敗枯死，尤其在溫暖濕潤的氣候下，更易得病。

防治法：①選健全的優良種苗（採苗時不要亂堆，必須基部向上倒置

農藥成份標準
保證品質優良

現貨供應



蟲



牌

巴拉松乳劑

馬拉松乳劑

PM乳劑

安特靈乳劑

DDT乳劑

地特靈乳劑

靈丹乳劑

魚藤精乳劑

利我農乳劑

速克丹乳劑

各地農藥零售商均有發售

中農化工廠股份有限公司

總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660.28895 工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154