

日乾。②設置良好的排水溝。③病株拔起後，應立即燒毀，切不可隨地拋棄。

金龜子

在甘蔗廢耕地種植鳳梨時發生較多。此種害蟲或咬斷鳳梨基部的幼根，或食害基部莖，被害鳳梨葉部變紅黃色，生育停止。

這種害蟲發生在地下，防治較難。或用小鉤頭掘穴捕殺，或用富粒多藥劑（二千倍）灌注於植株基部亦可殺死。


酵腐病

本病發生在鳳梨成熟果實，腐敗很快，是鳳梨果實病害中最可怕的一種。本病害在鳳梨園中果實未採收時也會發生，尤其在果實採收後的輸送中，和在工廠內的貯藏時期，發生損害最多。普通由果實基部開始到果實上部全果腐爛，開始時果皮褪成柔軟，表現病斑，被害部份顏色漸次變濃，發散特有香氣，又小部份發生水泡，表面呈白粉狀，然後變黑色。

防治法：目前尚無適當藥品，最好把被害果實隔開另外處理，以免污染他果。本病菌全由傷口侵入，所以採果搬運時，要避免傷害果實。

小果腐敗病

果實小果（果肉）變黑褐色後腐敗，從果實外面難以識別，被害部份不適於製罐或生食。果目粗大而破裂



微病病潤美梨鳳

，且果目中心稍凹入，花苞不完全，用手指敲擊時，其音很硬者有：

①黑目病：本病在各產區都有發生，發生季節雖不一定，但以果熟期最為普通，病菌由小果花腔或傷口侵入果肉，到果實成熟時形成（果肉）黑褐色的硬塊。

②花樟病：本病常發生在酸度較低的果實中，尤其是酸度低糖度高的夏果，最易發生。果實成熟時，果肉呈淡黃白色或赤褐色。

防治法：尚無適當方法，仍待以後的研究。

赤色病

赤色病果從外表看起來並無異樣，但是果實切開時，果肉多呈淡紅黃色，經過煮熟或加工，果肉內部組織變作淡褐色，沒有加工製罐的價值。

防治方法：尚無適當的防治方法。

果心病

本病以本地種發生較多，開英種則少見，從果實外表也難以識別，被害果實和病害的性狀有：①斷心果：果心斷為兩節，致果實上下兩端生育不整齊，成熟時果實上部一節果皮先變黃色，此種果實上部一節完全沒有鳳梨的風味，品質不佳。

此病的發生原因和防治法，都尚未十分明瞭。②心破病：果心中央裂開，成熟時果皮特別不好看，用手指敲擊時，發出好像果實裏面有空氣的聲音。本病是在果實開花後，除却冠芽時所用器具插入冠芽基部過深傷害果心而發生，所以除却冠芽時要特別注意，或雨天應停止除冠芽工作。

日燒病

本病在鳳梨果柄傾倒或果實橫向，受強烈日光曝曬時發生，被害部份果實變色硬化扁平，有些果皮裂開，果肉也硬，酸味很強，腐害者容易腐爛，所以被害果實都不適製罐和生食。

防治法：用竹皮或麻皮把鳳梨葉片捆束於果實上面，或用雜草蓋覆果實。

老鼠害

老鼠智慧很高，被害果實多為肉聲果，被傷害後的果實很快就腐爛，且無利用價值。老鼠不但損害果實，且會食害植株，如在冬季無果實時，還會咬傷植株或咬芽基部，食害嫩幼生長點。

防治法：放置殺鼠藥劑或捕捉器等，可以毒死或捕殺。

豐年讀者服務部

贈送農業推廣

小冊 單張

▽請沿點線剪下左表，在你需要的書名上面（即口內）畫一✓記號，並把自己的詳細住址和姓名填好，附所需郵票，封入信封內。

▽來信寄豐年讀者服務部。

▽例：你需要「土地利用七千年」小冊及「柿」和「杧果」單張時，請附郵票三元六角（3元+8角+8角）。

☐	土地利用七千年	附郵二元
☐	鳳梨栽培淺說	附郵二元
☐	怎樣改進柑桔生產？	附郵二元
☐	柿	附郵八角
☐	杧果	附郵八角
☐	李	附郵八角
☐	金柑	附郵八角
☐	蓮霧	附郵八角
☐	桶柑	附郵八角
☐	梅	附郵八角
☐	甜橙	附郵八角
☐	龍眼	附郵八角

住址：
姓名：