

### 西番果可製果汁

【問】：(一)西番果在本省有無推廣價值？其用途如何？  
(二)苗何處可買到？(桃園龜山鄉農會贈)

【答】：(一)西番果有大果及小果兩品種，小果在臺灣栽培歷史最久，現在山野間自然生長很多，成熟時農民隨意取食，大型種約在一九一三年初次輸入臺灣，在士林園藝試驗所試種，結果良好。  
(二)西番果截至日前，尚沒有人重視，該果主要用途為生食其假種皮，風味芳香爽口，果汁可混和一般冷飲或製作果醬及漬果等供食。

【問】：(一)果苗目前並不多，或可向一般果苗商洽購。(士林園試分所)

### 梨開花不結果的原因

【問】：(一)我有十年生的梨園數甲，每屆花季，都開很多花，枝葉茂盛，但有花無果，年年只結了幾個這是什麼原因？  
(二)隔隣為李園，梨與李開花期相同，是否受李花蕊的影響？  
(三)有何防治方法？(新竹縣關西鎮南雄里博愛路十六號羅吉鴻)

【答】：(一)十年生梨樹，開花不結果的原因很多，未能看到實際情況，頗難推斷，茲舉出數點以供參考：  
(1)不結果原因：(1)只栽一個品種，常有此現象。(2)開花時連日陰雨，常不能結成果實。(3)授粉昆蟲如野生蜜蜂數量過少，甚至該地沒有。(4)土壤過濕，氮肥過多，樹生長過於旺盛，常開花而不結實。(5)不行修剪，每年開花二次，亦能使果實生產減少。  
(2)如隔隣為果園，開花期相同，並無影響。如有可能者，是授粉昆蟲集中他果園，致影響梨的授粉作用。

以上均為想像，可自行觀察是否有以上某一情形，再設法改善。

(3)如樹生長過旺，可設法使土壤排水，少用氮肥，多施磷鉀肥料，或於樹之基部行砍傷，以調整其生長勢，即可結成果實。如為授粉昆蟲過少，可以飼養蜜蜂，如為開花期降雨不停，則甚困難。(朱長志)

### 葡萄「褐斑病」

「波爾多液」可防治

【問】：依照來示再補送葡萄病葉五枚，請迅速鑑定指教病名及防治方法？(臺南關廟鄉橋脚七二號吳進泰)

【答】：寄來之葡萄病葉係褐斑病其防治方法如下：(1)病葉落下後集中燒燬。(2)充分剪定使通風透光良好。(3)注意排水。(4)六月中、下旬撒布四一四式「波爾多液」。直至收穫期撒佈三—三式，收穫後撒佈六一六式「波爾多液」。(吳福壽)

### 橫山梨嫁接接穗

採自五年生母樹

【問】：(一)橫山梨嫁接用接穗、以幾年生母樹取穗較適當？  
(二)有人說從一、二年生母樹取接穗，其生活率不高，或會變種是否事實？(臺中神岡鄉岸裡村中山路二十四號呂繼宗)

【答】：(一)橫山梨嫁接用之接穗，在已結果的成年樹上採取即可，至少應採自五年以上的母樹。  
(二)一、二年生樹上採接穗，將來育成的苗結果較遲，並可能有產量不高的現象，對成活率無大影響。(朱長志)

### 改良「大白杔」蘿蔔

適合北部夏季栽培

【問】：(一)請問有何種蘿蔔，適合臺北地區一期水稻收割後栽培？  
(二)貴報十四卷十四期刊載，新竹改良場，育成改良大白杔，在樹林一期水稻收割後是否可以栽培？  
(三)以上可種種子何處有售？(彰化二林鎮趙甲里鎮平巷十二號林金品)

【答】：(一)一期水稻收割後，因氣溫高，蘿蔔品種以大白杔較適宜。  
(二)新竹區農業改良場育成之改良大白杔，適於北部夏天栽培。  
(三)改良大白杔蘿蔔種子，由臺北市臺灣農業服務社出售。

【問】：(一)留種子需要選拔母本，同時注意環境四周田間，沒有其他品種的蘿蔔，以免雜交發生變種。(陳培昌)

# 長岡 交配 初秋甘藍

全天候 高麗菜

耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早穫種，發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍，外銷最受歡迎，價格最高之甘藍。

「說明書備索」

生產：日本夕キイ種苗株式會社  
總代理：茂生有限公司

全省各大種子行有售。  
臺北市南昌路二段六六號之二  
電話：二一八〇九八五〇  
二一八〇九八五〇  
二一八〇九八五〇


享譽已久 公認的效力

## 福利來



新貨已到

即請購用



雞白痢特效藥「福利來」為供應新維育成的成功特別實行八折大優待。  
每罐一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。

「說明書備索」

各地 均售

總代理：英商卜內門洋碱有限公司  
臺北市中正路一八〇〇號  
經銷處：國際家畜藥物廠  
臺北市長安東路一段三九號