

農友經驗



夏季綠肥混種玉米

本省農友犁田，大都還是用水牛。中南部第一期作物收穫後，必有一段時間可以種植綠肥。我的經驗是：當我們播種夏季綠肥如田菁等時，可把玉米種子和田菁子一同播下；每分地，約可混種玉米種子一臺斤。等發芽生長到第二期作物播種前，要翻埋田菁整地時，玉米亦已長出，莖葉正青嫩柔軟，便可割來供牛吃。（雲林縣林內鄉九芎村長流仔十一號曾文信）



友農信文曾

香蕉疏果矯正果形

現在氣溫已提高，春夏蕉發育迅速，致果指常有偏斜，呈獅頭形、或果指柄不整齊等情形，在檢驗時被檢為內銷品多麼可惜，我願意提供幾點矯正香蕉果形的經驗：

(一)疏果：要使上端和下端果子符合外銷標準，如第一段果子獅頭形或不足十二條指的要疏掉。在摘心時發現果子上排，果指有兩連時應疏掉，可使鄰近果指發育平均。下端果子要視香蕉健全葉和莖葉的大小，酌情疏去一至三段，以我經驗全葉十枚留八段的比較，並應參照莖葉大小，如偽

莖中段直徑廿五公分以上可留七、八段。

(二)矯正果形：矯正果房位置 and 地面成垂直，如矯正果房位置正確，可減少矯正果指的麻煩。第一段果子的果指柄中央部份，常有凹入不齊，可在果實三分成熟時輕輕將凹入的果指拉出，用乾而柔軟的葉夾在果指板內，使它平均，如偏斜時應矯正，如果指發育過彎，插入上端果座亦應輕輕拉出，才不致過彎。夾在果指柄的香蕉，應在約六分成熟時取出。（雲林縣土庫鎮崙內里頂寮三十六號許啓宗）

中部麻竹穀雨後種植

幾年來本人和附近的農友們，所種麻竹都是在二、三月交春前後，用直立種植式，到了三月雨量稀少，地面乾燥，很容易枯死，成活率低。

今年，我改在三月末，穀雨後大約一週先挖好竹穴，用倒植式栽種，竹苗埋上鬆土約五十公分，另一端露出地面，按地勢偏斜而靠近地面，然後把鬆土壓緊，蓋上一些雜草，預防日晒，保持水份。

到了農曆四月，雨量便會日漸增多，有利於竹苗的發育，用這種方法所種的麻竹，成活可率達百分之九十八。可見山地種植或灌溉困難地區，是須要在適當時間，用這個這種方法來種植的。

(南投縣埔里鎮蜈蚣里乾溪路十六號張文華)



友農華文張

各位期待已久之本廠出品
巴拉松乳劑、馬拉松乳劑
安特靈乳劑等現已出品應
市，本藥劑係本公司前派
赴日本「北興化學」實習
之技術人員回國製造者，
為慎重計調製當時尚請
「北興化學」技術人員監
製，絕對保證品質敬請各
位農友認明商標放心按照
指定倍數使用。



大勝農藥

北興化學工業株式會社

大勝貿易有限公司

大勝化學工業股份有限公司

臺北市南京東路一段四八號四樓

電話：41337・45877

廠址：三市大有街20-2