

如何改進平地秋蕉的品質？

王兆全

普通所謂秋蕉，是在七至九月開花至十二月收穫。秋蕉的開花期，適逢南部的兩期，果實發育期，又逢乾燥期；而在發育過程中，所需日數較短，僅次於夏蕉，平均是一百零四天，直接影響品質和風味，同時又是颱風期，葉易吹破，株易折斷，果實易傷害，因此，改進平地秋蕉的品質，顯得特別的重要。

防颱·排水·施肥·灌溉

秋蕉的開花和發育都在雨季，同時也正是颱風季節，而香蕉的植株又高大，如遭受颱風吹襲，會造成嚴重的災害，因此防颱措施，絕對不可忽略。可依照本刊十五卷十一期預防颱風辦法辦理。但蕉園積水過多，園地極度濕潤時，應多挖排水溝，迅速疏通水路，儘速排除積水，以免淹浸過久，蕉根腐敗，葉片萎黃，影響果實發育，降低品質。

秋蕉因在雨季開花，雨季後發育，香蕉風味較差，必需多施鉀肥，增進甜味，成熟劃一，使肉質細膩。雨季前後，調節施肥，雨季過後，必須注意灌溉。五、六月施肥，可助長抽穗，果指增多。九至十月雨後施肥，更能增進發育，促使果實肥大飽滿、光亮肥大，所以非常重要。同時十月以後，天氣乾旱，果實發育需水很急切，必須及時灌溉，改進品質。平地秋蕉灌溉每隔兩週一次，砂壤土每月灌三、四次壤土每月灌二、三次。

噴藥·治病·套袋·疏果

葉斑病是影響秋蕉發育和品質的最大敵害，應在雨季期內，間斷噴佈五百倍的大生廿二，因為如遭受了這種病，蕉葉枯乾，本身製造養份的能力減少，果實發育中斷，使內部品質變劣，同時更重要的是要剷除枯葉，集中燒燬。

秋蕉開花期多在雨季發育較快，整疏極重要，所留段數，每一果房以六至八段為宜，多的摘除，可促進本身果實肥滿，九月後天氣乾燥，太陽直射

果面，易遭傷害，必需套袋。同時季節風多，灰沙塵土易污染果面，可用套袋防除，不過在採收前一週，把袋除去，使果色轉化青綠而正常，增進品質。

除塵·防壓·避震·輕抬

香蕉因受外界條件而影響品質的有下列幾點：

- (一) 果面灰塵多，不清潔。
- (二) 成熟度不一致。
- (三) 擦傷、壓傷。
- (四) 蟲咬傷及疤痕。
- (五) 竹籠墊鋪材料過薄、擠傷刺傷。
- (六) 裝籠捆紮時用力過度、震動、緊壓及車行過快等都會引起振盪傷害。

秋蕉的收穫多在九至十一月間，季節風多，因此對吹傷、擦傷以及果面上的灰塵，都要特別注意，輕輕用毛帚拭去，同時蕉果生長在蕉株上時，把容易擦傷果面的蕉葉，儘量割掉外，割蕉時最好兩人合作把割下來的香蕉，用軟布包紮抬

在肩，搬入車內時也要處處小心，隨時注意，因為平地秋蕉果皮比春蕉薄，更容易擦傷折傷，所以輕抬直接可以減少人為的傷害，間接可以收提高品質的效果。



(植物綜合微量要素·液體葉面散佈劑)



一試見効

說明書備索

新出品

「果樹專用」

人畜 無害
綜合微量要素劑
施葉養元
シオヤゲン
500 CC



唯一
「外銷東南亞」
信用·効力·保證·風行海內外
植物綜合微量要素之霸王

協和化學工業股份有限公司

臺北市華陰街39號 電話：46980