

農業信箱



香蕉插立支柱

注意選擇方向

【問】：(一)香蕉立支柱，幼株及成長株是否立於同一方向？秋冬季之季節風與颱風所立支柱方法可相同嗎？

(二)香蕉結果末屆成熟，突由軸部(果房下垂之彎曲處)折斷，除象鼻蟲加害，縛繩素

不適當，鉀肥少等因外，另有原因嗎？(雲林二崙鄉農會廖文男)

【答】：(一)香蕉吐穗方向以東南向最多，而一般風通常來自北、西、南三方者居多，因此插立支柱以東南向為適宜，其次為西北向，未吐穗的成長株，可與幼株立於同一方向。秋冬季之季節風與颱風之立支柱大致相同，惟颱風期應多加支柱，將植株用草繩多細數段，插入土中亦要深，以堅固為首要。

(二)因風搖動過烈，本身果房負荷過重，外傷害等也能使果軸折斷。(王兆全)

番茄如何採種留種？

【問】：(一)番茄成熟後如何取出種子？

(二)種子如何貯藏？

(三)貯藏時間多久不變壞？

(四)自己所留種的種子，會變種嗎？(臺東鎮豐里里二二號陳光友)

【答】：(一)將果實橫切成為二片，用手

擠出種子及內容物和果汁，於玻璃杯中，放置二十四小時至三十六小時，經過醱酵後果汁上面自然浮現一層膠質膜(溫度二八—三〇度)。

(二)將浮成的膠質膜除去，經水洗後先風乾一晝夜，後才陽乾，如陽光過強烈，宜覆麻布等，以減少光量而降低溫度。

(三)經過充分乾燥的種子，貯於空酒瓶(裝滿為佳)可保持一年，但瓶口須密封，如貯於玻璃乾燥器可保持三年。

(四)自己留種須選母株，並用人工授粉套袋，才不會變種，如附近有種植其他品種，更易變種須注意。(王進生)

臺中蓬萊密植

每坪種九十棵

【問】：近來本地水稻密植是八寸四方，我想二期作水稻密植為八寸×七寸，不知此法是否過密，會發生何種弊端？對於產量及管理種種問題請指教。(彰化竹塘鄉溪墘村阿陽路十號侯益民)

【答】：臺灣擬用密度尚不屬密植，臺中地區蓬萊種可密植為八寸×五寸(每坪九十棵)，臺中在來一號可為八寸×六寸(每坪七十五棵)，密植效果相當優良。但需要配合深耕，增施堆肥，合理增施三要素肥料，並合理分次追肥，加強病蟲害防治等，方能收到密植效果(楊儒榮)

梨樹嫁接改進品質

【問】：(一)軟枝水梨是不是必須經過嫁接？

(二)如不經嫁接的軟枝水梨，是不是可以照樣結果？

(三)如能結果，大概要幾年？

【答】：(一)嫁接與未經嫁接的軟枝水梨，有什麼主要的區別？(嘉義白州町嘉陵六巷一號張幼鯤)

【答】：(一)任何梨為使生長旺盛，產量高，適應環境，均宜採用嫁接法繁殖。

(二)未經嫁接的梨雖然可以結果，但產量及適應環境等則較差。

(三)打插苗因無嫁接之作用，可能結果稍遲些。

(四)嫁接枝因受砧木之影響，可能使產量高而果實品質較佳，生長健全。(朱長志)

農藥成份標準
保證品質優良

現貨供應



巴拉松乳劑

PM乳劑

安特靈乳劑

地特靈乳劑

魚藤精乳劑

速克丹乳劑

馬拉松乳劑

DDT乳劑

靈丹乳劑

利我農乳劑

各地農藥零售商均有發售

中農化工廠股份有限公司

總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660.28695 工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932164