荔枝落果原因「空仁」及蟲蛀最多

【問】：荔枝落果非常厲害，約有十分之七左右，損失慘重，荔枝爲十年以上，以前很少有此情形，在這兩、三日中落果最多。現附上標本，請檢查是何原因，以便及時防治。（彰化芬園鄉舊社村新興巷五號曹孔哲）

【答】：荔枝落果主要者有兩種，一爲空仁果實，自結實一星期開始脫落，至成熟前一個月停止；一爲蟲害果實，自空仁果實停止脫落後，如仍有果實繼續落下，此等落果則大多數爲蟲害果實。荔枝自新曆四月中旬開始，即需用五十%「賽文」可濕性粉劑三百倍，或五十%「速滅松」，或五十%「力拔山」等一千倍防治。每十日噴佈一次，至採收前十天停止。產量便可保證。（張振宙）

白木耳銷路尚待開拓

【問】：㈠種植白木耳書何處有售請介紹。㈡請介紹可靠菌種。㈢白木耳目前銷路及將來前途如何？㈣目前白木耳價格若干，一百臺斤木材能收多少白木耳。（鳳山果協新村一四一號張崇源）

【答】：㈠白木耳栽培法與香菇及普通木耳栽培法大同小異，可參考本刊第十卷二十四期及十一卷十期。

㈡臺中縣霧峯鄉坑口村「坑口養蜂菌場」，及霧峯鄉甲寅村「林養菌園」，都有好白木耳菌種。

㈢目前白木耳的銷路尚在開拓中，將來的前途可能沒有洋菇好。

㈣白木耳的價格每臺兩約八十元，一百臺斤木材平均可收新鮮白木耳三—五臺斤。（胡開仁）

廣葉杉的造林問題

【問】：㈠廣葉杉造林栽植時，其生長對方向是否有差別？㈡栽植時其密度多寬爲宜？㈢民國四十五年栽植，到五十年是不是可以砍伐，其高度及徑口約有多少（向東）？㈣面積約〇・五公頃，方向坐西向東，栽植約一千一百株其間有栽植香蕉是不是會影響其生長？其與無種植副產物之杉木比較有何差別？（樹齡十三年）。㈤假如出售甲地之林木，必須由甲地採取標準地。如由乙地採取（方向、密度、高度及樹齡等都不同）是不是適當？（東勢廣興中新路西新巷七七號陳和耀）

【答】：㈠廣葉杉造林，其方位對造林木具有影響，以東西向而論，則東向最佳；以南北向而論則南向爲佳，但其影響程度沒有東向對西向的顯著。

㈡民國四十五年種植的廣葉杉，目前正值生長旺盛時期，不宜全部砍除。如因需要，可選取生長優良者採伐一部份，此項小材頗合市場需要價格尚好，其餘樹木因間伐而生長更見旺盛，頗合乎經營原則。

十年生廣葉杉，平均胸高直徑約十至十四公分，樹高八至十二公尺。但樹木生長，對其生育環境與作業情形具有密切關係，故優劣之差別甚大，須實地觀察方可估計其經濟價值。

㈢廣葉杉造林現多主張密植，每公頃植三千至四千株；如植三千三百株，則行間距離以二公尺，苗間距離以一・五公尺。

㈣、十三年生廣葉杉五分地，通常應有一千七、八百株至二千株，現台端的造林地，僅有一千一百株，可見林內較稀疏，但若混植香蕉，香蕉生長恐怕不會優良，不如犧牲林木，悉數砍伐。

㈤出售造林樹木無論租地造林或私有林，宜在該林內實行「每木調查」，查定林木之材積，不可藉其他造林地資料推定。（江濤）



爲保證稻作豐收 農立 立農農藥向您供應品質可靠的製品
敬請就近向各地經銷商農會購用

防除螟害最新低毒性有機燐劑
立農 滅拉松乳劑
防除螟害强力殺蟲劑
立農 巴拉松乳劑
防除黑尾浮塵子飛蝨類特效藥
立農 馬拉松乳劑
浮塵子及蔬菜害蟲尅星
立農 靈丹乳劑
蓬萊稻稻熱病新藥
武田 滅爾錠

農立 立農農藥