

早生圓球形甘藍品種 注重基肥及初期追肥

【問】：甘藍有一種圓球形，是何品種？栽培時期及管理方法如何？（彰化埔鹽鄉三省村好金路十一號陳丁印）

【答】：（一）所提圓球形甘藍品種，目前在本省所栽培品種中，計有「長岡交配六十日」、「梅若」、「黑葉理想」及 Golden Acre 四種，其中以「梅若」耐輸送，其餘稍差。

（二）長岡交配六十日、「黑葉理想」及 Golden Acre 適於九月至十一月播種，該等品種適於密植栽培，行株距六十×四十公分，管理與一般甘藍路同，惟因早生品種的關係，應注意基肥及定植後三十五天前之追肥，以促進初期生育提高產量，「梅若」播種期為九月下旬至十二月上旬，其栽培管理與一般甘藍相同，本品種較抗蟲，尤以較抗小菜蛾。（王進生）

北部也可栽培「竹筴」

【問】：（一）「竹筴」在臺北樹林鎮山城地，是否適合栽培？

（二）栽培時期幾月最適？

（三）竹筴在北部售價是否和蘇竹筴同？

（四）竹筴在北部售價是否和蘇竹筴同？彰化二林鎮趙甲里鎮平巷十二號林金品）

【答】：（一）「竹筴」集中於南投、雲林及彰化三縣之交界地區，通常在海拔四百公尺以下，惟移植於高雄「六龜」二百五十公尺及「扇平」七百五十公尺，其生長仍極優良，可見在南部七百五十公尺以下地帶均稱適宜。「竹筴」喜生長于鬆軟肥沃之砂質壤土，尤以溪邊或河岸之沖積土，生長最優良，臺北縣樹林鎮山城地，可能適于「竹筴」之栽植。

（二）「竹筴」栽植時期北部以清明前後，即二至四月為最適宜，南部可在七至九月雨季時栽植。

（三）「竹筴」採筴在中部為四至十一月，以六至八月為發筴最盛時期。此與當地降雨時期，是否有灌溉，管理方法等都有密切關係，雖同一地區，遲早也可能不一致。換言之，管理方法，也可以調節發筴時期。

（四）「竹筴」竹材與蘇竹性質相近，據林業試驗所之研究，認為頗適于造紙。

（五）「竹筴」在北部僅有林試所及慶復會合作，在南港鎮設立一採筴園，供繁殖及生長觀察之用，倘無竹筴可供出售，將來北部「竹筴」竹筴價格，仍不敢估計。（江濤）

尿素·氯化鉀·過磷酸鈣 混合後應在二小時內施完

【問】：（一）舊有的肥料配合圖中，尿素與過磷酸鈣混合後可以立刻使用，但目前新印的肥料配合圖却不能混合使用，請問何者較正確（指施肥的肥效而言）？

（二）氯化鉀、過磷酸鈣及尿素，三種肥料混合後立刻使用，肥效會不會損失？（臺南下營鄉中營村二五四號陳清亭）

【答】：（一）尿素及過磷酸鈣可混合，但如能加菜子餅、米糠等有機質時，施用方便，如不加有機質時容易潮濕施用不方便。早作物可混合有機質一齊施用，水稻可混合後立刻施用。

（二）尿素加過磷酸鈣加氯化鉀三種肥料混合後容易潮濕，應立刻使用（二小時以內），否則使用不便，且會影響肥效。（吳石生）

虎爪豆有毒餵豬應注意

【問】：（一）虎爪豆如何處理才可餵豬？懷孕母豬是否可餵？

（二）什麼地方有「頂雙溪」小母豬出售？（臺中縣和平鄉博愛村五二號詹春吐）

【答】：（一）過去尚未有虎爪豆餵豬的試驗報告，據悉虎爪豆含有有毒的「鷹鹼」，故無人用為飼料，如想做飼料，應經過磨碎煮沸處理後，才可少量餵豬，可能無害，但切勿餵多，懷孕母豬不可餵，以免引起不良後果。

（二）宜蘭「恒生畜產種畜場」有出售「頂雙溪」小豬。（張聯欣）



敬告全省同胞：本公司出品之「可樂農」農藥，係日本兼商株式會社出品，其效力強大，且無副作用，為農家必備之良藥。請認明包裝上的商標，以免誤購。

正一公斤進口原裝貨

（正面）CORONA （反面）

日本：兼商株式會社榮譽出品
臺灣總代理：經華貿易股份有限公司
臺北市民生東路232號（臺北市郵政信箱1764號）

新發明 最新進口

安喜樂 Anthio

果樹特效藥！！
紅蜘蛛·蚜蟲·介殼蟲
椿象·捲葉蟲的剋星！

現貨供應 南部地區：臺南縣學甲鄉濟生路187號
裕峰農藥行·妙和西藥行
東豐貿易股份有限公司
臺北市天水路15號 電話：44309·50945

大信農藥
二化、三化螟蟲的剋星！

可殺 樂殺 殺乳劑
殺蟲 蟲寶 乳劑

百聞不如一試！！
其他各種農藥供應
大信農化工廠有限公司
臺北市天水路15號 電話：50945·44309