

### 早生圓球形甘藍品種 注重基肥及初期追肥

【問】：甘藍有一種圓球形，是何品種？栽培時期及管理方法如何？（彰化埔鹽鄉三省村好金路十一號陳丁印）

【答】：（一）所提圓球形甘藍品種，目前在本省所栽培品種中，計有「長岡交配六十日」、「梅若」、「黑葉理想」及 Golden Acre 四種，其中以「梅若」耐輸送，其餘稍差。

（二）長岡交配六十日、「黑葉理想」及 Golden Acre 適於九月至十一月播種，該等品種適於密植栽培，行株距六十×四十公分，管理與一般甘藍路同，惟因早生品種的關係，應注意基肥及定植後三十五天前之追肥，以促進初期生育提高產量，「梅若」播種期為九月下旬至十二月上旬，其栽培管理與一般甘藍相同，本品種較抗蟲，尤以較抗小菜蛾。（王進生）

### 北部也可栽培「竹筴」

【問】：（一）「竹筴」在臺北樹林鎮山城地，是否適合栽培？（二）栽培時期幾月最適？（三）北部採收期是何月？

【答】：（一）「竹筴」在臺北樹林鎮山城地，是否適合栽培？（二）栽培時期幾月最適？（三）北部採收期是何月？

（四）竹筴是否造紙之好原料？

【答】：（一）「竹筴」集中於南投、雲林及彰化二林鎮趙甲里鎮平巷十二號林金品）

彰化三縣之交界地區，通常在海拔四百公尺以下，推移植於高雄「六龜」二百五十公尺及「扇平」七百五十公尺，其生長仍極優良，可見在南部七百五十公尺以下地帶均稱適宜。「竹筴」喜生長于鬆軟肥沃之砂質壤土，尤以溪邊或河岸之沖積土，生長最優良，臺北縣樹林鎮山城地，可能適于「竹筴」之栽植。

（二）「竹筴」栽植時期北部以清明前後，即二至四月為最適宜，南部可在七至九月雨季時栽植。

係，雖同一地區，遲早也可能不一致。換言之，管理方法，也可以調節發芽時期。

（四）「竹筴」竹材與麻竹性質相近，據林業試驗所之研究，認為頗適于造紙。

（五）「竹筴」在北部僅有林試所及慶復會合作，在南港鎮設立一採苗圃，供繁殖及生長觀察之用，尚無竹筴可供出售，將來北部「竹筴」竹筴價格，仍不敢估計。（江濤）

### 尿素·氯化鉀·過磷酸鈣 混合後應在二小時內施完

【問】：（一）舊有的肥料配合圖中，尿素與過磷酸鈣混合後可以立刻使用，但目前新印的肥料配合圖却不能混合使用，請問何者較正確（指施肥的肥效而言）？

（二）氯化鉀、過磷酸鈣及尿素，三種肥料混合後立刻使用，肥效會不會損失？（臺南下營鄉中營村二五四號陳清亭）

【答】：（一）尿素及過磷酸鈣可混合，但如能加菜子餅、米糠等有機質時，施用方便，如不加有機質時容易潮濕施用不方便。早作物可混合有機質一齊施用，水稻可混合後立刻施用。

（二）尿素加過磷酸鈣加氯化鉀三種肥料混合後容易潮濕，應立刻使用（二小時以內），否則使用不便，且會影響肥效。（吳石生）

### 虎爪豆有毒餵豬應注意

【問】：（一）虎爪豆如何處理才可餵豬？懷孕母豬是否可餵？

（二）什麼地方有「頂雙溪」小母豬出售？（臺中縣和平鄉博愛村五二號詹春吐）

【答】：（一）過去尚未有虎爪豆餵豬的試驗報告，據悉虎爪豆含有有毒的「鷹鹼」，故無人用為飼料，如想做飼料，應經過磨碎煮沸處理後，才可少量餵豬，可能無害，但切勿餵多，懷孕母豬不可餵，以免引起不良後果。

（二）宜蘭「恒生畜產種畜場」有出售「頂雙溪」小豬。（張聯欣）



敬告全省同胞：本公司出品之「可樂農」農藥，係日本兼商株式會社出品，其效力強大，且無副作用，為農家必備之良藥。請認明包裝，以免誤購。

正一公斤進口原裝貨

（正面）CORONA （反面）

日本：兼商株式會社榮譽出品  
臺灣總代理：經華貿易股份有限公司  
臺北市民生東路232號（臺北市郵政信箱1764號）

新發明 最新進口

# 安喜樂 Anthio

果樹特效藥!!  
紅蜘蛛·蚜蟲·介殼蟲  
椿象·捲葉蟲的剋星!

現貨供應 南部地區：臺南縣學甲鄉濟生路187號  
裕峰農藥行·妙和西藥行  
東豐貿易股份有限公司  
臺北市天水路15號 電話：44309·50945

大信農藥  
二化、三化螟蟲的剋星!

可殺 樂殺 殺乳劑  
殺蟲 蟲寶 乳劑

百聞不如一試!!  
其他各種農藥供應  
大信農化工廠有限公司  
臺北市天水路15號 電話：50945·44309