

農業信箱



木耳「白黴病」

用「大生」防治

【問】：木耳最近發生白菇如附標本，現已延及整枝木頭，使剛長出之木耳無法長成，甚至腐爛，影響收量很大，有何方法防治？（彰化竹塘鄉新廣村光明路三大號曾炳輝）

甘蔗複合肥料

配售契約蔗農

【問】：貴刊刊出的複合肥料，市面上是否有賣，每包重量及價格多少？（苗栗銅鑼鄉樟樹林二八號顏錦飛）

【答】：目前市面上只有臺灣糖公司配售甘蔗複合肥料一種，其三要成分為氮磷鉀二十一·五·十，每包四十公斤，每公升三、四元，契約蔗農可向附近糖廠契約貸配。其餘香蕉複合肥料尚在試驗中。（吳石生）

禾根豆適合高屏區秋作

【問】：（一）在臺灣栽培大豆春作與夏作何種產量較高？請舉一或二品種之實際產量比較說明，又引起此種差異之原因何在？（二）本省「禾根豆」栽培法有何優劣？

【答】：（一）今年雜糧作物品種命名登記審查通過的大豆新品種有那些？其特性各如何？（屏東郵政七一五四附一號李茂孝）

【答】：（一）適合本省各地區栽培的大豆品種及其產量，請參考農林廳農復會編印「臺灣雜糧作物品種圖說」，引起大豆產量差異原因有氣溫、日照、土質及栽培管理等。（二）「禾根豆」省工省時，高雄屏東地區秋作大豆，適宜此種栽培法，其他地區則不適宜。

【今（五四）年命名登記的大豆新品種，有「中興一號和二號」，該兩品種為省立中興大學農學院盧英權教授所育成，其親本為「黃寶珠」與「屏東青皮豆」，其特性為早熟、豐產、純感，適合本省中南部春秋兩季栽培。（劉文慶）

栽培前應與工廠訂約

【問】：（一）抱子甘藍在十月上旬播種，十一月中旬定植是否可以？（二）播種到定植最好幾天？行株距多少最

適合？（三）怎樣施肥？（四）定植後多久可以採收？（五）現在本省栽培面積有多少？有無工廠收購加工？市場消費量與價錢如何？是否可大量栽培？

【答】：（一）抱子甘藍在十月上旬播種，十一月中旬定植是可行的。行株距多少最合適，視品種而定。施肥應以磷鉀為主，每公頃施磷鉀二十至二十五公克。採收時間視品種而定，一般播種後三至五個月可採收。本省目前栽培面積約有五百公頃左右。市場消費量與價錢因地區而異，一般每公頃產量約二十至三十公噸。是否可大量栽培，視市場需求而定。

青苗期三十至三十五天，行株距七十至五十公分左右

【問】：（一）肥量較甘藍高五成左右，三要素之施用量為氮素三十、三十二公克，磷素七至二十五公克，鉀素二十五、二十七公克。（二）陳文村）

【答】：（一）可以。

【內銷僅向美軍顧問團出售，如有意栽培宜與加工廠接洽，以訂契約栽培較妥當。（六）臺北市通化街農產企業公司有售種子，以長岡交配早生種較優，每分地之播種量二十五至三十公克。（王進生）

農藥成份標準 保證品質優良

現貨供應



巴拉松乳劑

馬拉松乳劑

PM乳劑

DDT乳劑

安特靈乳劑

靈丹乳劑

地特靈乳劑

魚藤精乳劑

利我農乳劑

速克丹乳劑

各地農藥零售商均有發售

中農化工廠股份有限公司

總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660.28895 工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154