

茶

花

栽

培

前

程

似

錦

楊紹溥

茶花原產我國，自古以來，就是很名貴的木本花卉，十七世紀時由我國傳入歐洲，變為世界名花，由於歐美人士對茶花的熱愛，而今在園庭栽植，已如玫瑰或百合花一樣普遍。

今後茶花栽培的展望，可以說前程似錦，因而栽培方法、技術和品種研究等，都需要及時的努力探討和改進。

優良品種

臺灣茶花的品種，根據筆者的調查，可分下列三類：

(1) 山茶：其變種有二十四種：①早春，②白寶塔，③荔枝茶，④紅牡丹，⑤觀音茶，⑥廣東粉，⑦朝鮮茶，⑧白六角，⑨粉牡丹，⑩白牡丹，⑪雙瓣茶，⑫三合會，⑬雙瓣朝鮮茶，⑭鯉魚珠，⑮七巧，⑯十八學士，⑰五寶，⑱九曲，⑲玫瑰茶，⑳蓋十三省，㉑大型十八學士，㉒紅六角，㉓寶司，㉔佛頂茶。

(2) 茶梅：其變種有十種：①淡紫，②淡紅，③粉紅，④白雲，⑤紫紅梅，⑥八重梅，⑦雙瓣梅，⑧白粉，⑨粉邊梅，⑩大白。

(3) 南山茶：其變種只有一種：①胭脂紅。

繁殖方法有二

茶花的繁殖方法，有扦插法和播種法兩種：

(1) 扦插法：這是今日一般所採用的繁殖方法，選妥母樹後剪取當年生的健壯枝條，並帶以少許去年生木質部，枝條長度以四寸左右為限，頂端只留二至三葉，其餘的葉子完全除去，插於土中，覆以遮蔽物（竹簾草簾均可），經常灌水，等完全

發根後，始將遮蔽物完全除去。

扦插時期以七、八月間最為適宜，生根率高，如果管理得當，生根程度可達九〇%以上，但因品種不同還是有相當的差異。

(2) 播種法：這是一種不大常用的繁殖方法，但是如果用種子來培育她的話，則可以產生很多不同品種的變異，根據歐美諸國茶花專家播種試驗的結果，不僅在花色、花形大小等可能有許多的變異產生，而且在葉子的色澤，大小，形狀，鋸齒等，也往往會有不同的情形發生，因此，在品種的改良研究上，具有高度的價值。

播種的時期以春季為宜。

栽培管理要點

茶花的栽培管理，和其他觀賞花木有所不同；因為茶花名貴，當然在培植上較為困難，所以當栽植的時候，非給以適度的管理，不能收到理想的效果。一般栽培管理要點如下：

(1) 移植：茶花的移植，在臺灣來說，從十二月開始到翌年的三月間都很適宜，但是新芽一經發出，則需停止移植工作。移栽茶花，一定要帶有土團，而土團的大小，則視植株大小而定。當種植的時候，在穴的下部先填以少許的土，種植之後，需以木棍扎緊，萬勿使樹幹有所搖動，致使被風吹入縫中，以致枯死。

(2) 澆水：茶花的澆水，非常重要，因所植土壤或粘或沙的不同，所需澆水份量也有差異。砂質壤土種植的茶花所需的水量，是多於粘質壤土內所種植者。茶花的習性是喜愛濕潤，所以種植的地方，不能太過乾燥，最好是保持濕潤但是也不能太

濕。

在夏季裏，茶花還是需要澆水的。這不但對茶花植株生育有益，同時如果用噴洒方式來澆水的話，還可以在清潔茶花的葉子。但是葉面的噴洒時間，最好是在清早或傍晚，切勿在正午時間舉行。

(3) 施肥：茶花是愛好酸性的花木，所以施用酸性肥料效果最好。

茶花的施肥時期以濕潤時為宜，同時，肥料施用不能太接近樹幹。

堆肥是一種最好的肥料。尿素和硫酸銨等都是最為有效的化學肥料，但是在施用的時候，一定要注意分量，不然的話，是相當危險的。

至於施肥的時期，通常在十二月間施肥一次；這對植株生育的養分保持具有很大的意義。四月間的施肥，對新芽的生育需要有關。十二月間的施肥，注重氮肥如尿素、硫酸銨等，當有令人滿意的效果。

注意防治害蟲

茶花通常所發生的害蟲，根據筆者的初步觀察，有下列兩種：

(1) 茶毒：這是一種茶花的大害蟲，很普遍，羣棲為害專食茶花的綠葉，狀如蠶。防治法：噴射五〇% DDT 乳劑或四七%「巴拉松」乳劑各一千倍稀釋液；或二五% DDT 乳劑四百至六百倍。

(2) 木蠹蛾：本蟲幼蟲蛀入茶花樹枝木質部，食成隧道，有時穿入樹幹，使全樹枯死。防治法：發見被害樹枝即將其折斷捕殺幼蟲，或由蟲孔注入 PM 或「巴拉松」等乳劑稀釋液毒殺。

雲南林業調查所 合南區農業改良場最近對雲南嘉應四縣各鄉鎮公所農會發出本年度第一次農作物病蟲害發生警報，呼籲農友們注意防治稻飛蟲和一點螟蛾，以確保本期稻作生產。