原裝進口 ● 現貨供應
防治水稻二化螟虫
最特效有機燐殺蟲劑
必愛用 PIN 45%乳劑
藥效久
低毒
好用
果樹蔬菜殺菌劑
銅水和劑 500g×80包 (ドウジエット)
植物生長促進劑
荷蒙綠 1Kg×20包, 500g×40包 (ホモグリーン)
强力展着劑
日展 300cc×30瓶, 500cc×20瓶 (ニツテン展着劑)
日產化學工業株式會社 製造
最新強力殺菌劑
大生精 液劑
ダイセン ステンレス
全球專利　不留汚　奇效
主要適用作物：果樹，蔬菜，花卉，水稻，桑園，香蕉等。
適用病害：疫病，炭疽病，白粉病，銹病，黑點病，斑點病，葉斑病，葉霉病，葉枯病，白絹病，霜霉病，苗立枯病，水稻白葉枯病，立枯病，香蕉葉斑病，褐斑病，土壤殺菌，其他細菌性病害。
使用倍數：2000倍—3000倍。
使用方法：病害發生時每隔2～3天噴佈一次，即機3～4次立見效效。
東京有機化學工業株式會社 製造
臺灣總代理 日星實業股份有限公司 電話：40550 40660 ● 47374
臺北市南京西路五號之一

蔭植物棄遮覆。茶樹定植都採用等高線種植，行距三至四・五呎，正常標準爲四呎，株距一・五至三・五呎，通常都爲二呎。以四呎×二呎計算，每英畝約植五千四百株。

茶園除草每月一回，排水溝渠也須清理，視沉泥情形一年清理一次或兩次。幼苗施T二〇〇號混合肥料，第一年每苗四分之三英兩，第二年一英兩，第三年一・五英兩，均分四次施用。此後即可用T七〇〇或T七二五號混合肥料。

幼苗一旦成長至適當種度，即須摘心或拗壓。有些栽培者喜歡先摘心而後將抽發的新梢拗壓。有的喜立即將枝條拗壓，也有不拗壓而用刀分次定剪促進樹勢伸展。剪定方法是將茶株在離地面約六吋的部位剪除，如行拗壓則須候所發新梢生長約達六吋長轉變紅色時，分向四方拗下，用竹片加以固定，儘可能使枝條平伏地面，如此能使茶葉發展良好，比光用刀定剪，成長迅速。當新梢自壓下的枝條長出，再度施行剪定，高度約爲十二吋，同時可選苦干枝如前法拗壓，塡補前次拗壓的空隙。同樣第三次剪定，高度則爲十八吋，數月後摘抑茶樣枝條的頂稍，使樹高度在二十四吋，然後開始輕度採摘。

茶樹生長期間，須注意各種病蟲爲害，有害的樣草，也必須隨時除去。有害昆蟲爲葉捲蟲和金龜子，可用DDT劑噴殺。在噴撒DDT前，先將茶樹採摘乾淨，噴撒後三星期內不得採茶，此間隔時間已足避免DDT毒性遺留於成茶之中。在錫蘭茶樹害蟲中有一種蛀心蟲，曾使茶園遭受嚴重損害多年，至最近三年方有克制的辦法：在剪枝後噴撒一地特靈」於茶樹基部的枝條上，能有效減低此蟲發生率。所不幸者，「地特靈」同樣也殺死了葉捲蟲的天敵，噴撒「地特靈」後反有增殖的傾向，所以常須加用DDT劑於剪定時期噴撒。在高海拔地區另有一種很普遍的根病叫做Poria (多孔菌科Poly Paraceae)，是經由根樣間相互交錯的根傳播，爲害結果能致茶樹枯死。此病的防除，祇有將病樣及其鄰接茶樣一併掘除，染病地區四周挖掘深溝使與鄰地隔斷，土壤用DDT蒸蒸劑施行消毒處理，兩年內不再種植。茶餅病在錫蘭也很普遍，如不用殺菌藥劑有效防治，對茶樹生機將有嚴重損害。幼木茶園每星期噴用藥劑一回，採摘茶園在潮濕或多霧天氣，採摘後立即噴藥，銅質殺菌劑每畝使用量爲四至六英兩藥劑和水二加侖，用動力噴霧機撒佈，或和以十五加侖水用Knapsack式噴藥器撒佈。動力噴霧機一臺，在平坦茶園，一天能撒佈十五至三十英畝，Knapsack式噴藥器一天祇能噴一至三英畝。

茶樹開始生產後，在整個生長過程中每隔一定時間，必須施行剪枝，俾促進繼續生長適於製茶的柔嫩茶菁。錫蘭採茶四季不停，剪枝作業每隔一年半至六年舉行一回，依茶園方位，海拔，剪枝方式等情況衡定。海拔低的地區，正常剪枝週期爲一年半至二年，一般多用平剪或剪面中央稍作下凹的剪法，因低地樹澱粉保存量每較低少，所以樹上宜多保留樹葉。中海拔地區剪枝週期爲三至四年，方法採平剪、凹剪或深剪。

（未完，下期續）