

需注意的為防止根腐病與土壤線蟲為害。  
 (一)人心果很適應臺灣的氣候，不擇土宜，生長健旺，產量很高。但果實品質不佳，無特殊營養，易腐爛，不耐貯藏，不能加工利用，故不宜多種，管理方面最當注意果實成熟時期防治果實蟲。  
 (二)低海拔地或平地可種芒果，較高海拔的地方可種龍眼。其他如楊桃等深根性果樹也很適合。(張振宙)



**木屑灰砂鉀含量  
並不比稻草灰高**

【問】：貴刊十五卷十六期三十四頁李先生大文一文，圖讀後增加收益不少，請問：  
 (一)本地燒瓦廠木屑灰其燃燒溫度很高，未知是否可當做肥料，其含有可溶性矽酸及鉀多少？  
 (二)所說鐵粉及氧化鐵不知何處有售？  
 嘉義市新厝里二鄰世二號陳昭五)

【答】：(一)以木材製成之原料的草木灰，一般矽和鉀的含量不會比以稻草為原料的草木灰高，鉀一般在百分之六左右。可溶性矽雖無資料可查，很可能含量很低，不過可供肥料使用是沒有問題。  
 (二)關於鐵粉可說來源有限，鐵工場的銹鐵和鐵屑等經粉碎過篩也可得。一般建材行有一種紅色粉，其主成分雖為氧化鐵，但因為形態的關係並無效果。  
 氧化鐵在工業原料行可買到，以上兩種之價格都要比一般肥料貴，且尚有其他須考慮到的技術問題，最好由試驗機關來辦理，或僅以小面積試驗為宜。(李蘭帝)

**痔瘡潮濕的砂地**

**種荔枝不開花**

【問】：(一)我種荔枝五十棵，已有四年，但都沒開花結果，是何原因？  
 (二)砂地過溼是否不開花？  
 (三)是否枝葉太茂密或其他原因？(高雄)

鳳山鎮中山西路一七七號邱榮洲)  
 【答】：(一)砂地過于瘠薄時，荔枝發育不良，可能不開花。沙壤土和粘壤土最適合栽培荔枝。  
 (二)秋冬時期如土壤過于潮濕，可促使發新新梢，而不形成花芽，便無花可開。  
 (三)枝葉茂密的荔枝樹，秋後應會自然乾燥，不加灌溉，便可如期形成花芽。入秋乾燥與入冬寒冷，是促成荔枝形成花芽的兩個重要條件。(張振宙)

**南部水芋栽培要點**

【問】：(一)水芋在南部何時播種為宜？  
 (二)要選擇什麼品種？向何處購買？  
 (三)每株行株距多少？  
 (四)需要什麼基肥？每分地用量多少？  
 (五)需要什麼追肥？每分地用量多少？  
 (六)水量要保多少深度？  
 (七)可能有那些病蟲害？如何防治？  
 (八)要多久才能收穫？  
 (九)水芋需要培土嗎？  
 (十)其他有何注意事項？(屏東縣萬丹鄉寶厝村蔡清仲)


【答】：(一)在南部水芋栽植時期為七月至九月，最適宜栽植期為八月間。  
 (二)可採用檳榔心芋，種芋在高雄縣甲仙鄉可購到。  
 (三)行株距均為一公尺四寸，一分地大約可栽五千五百株。  
 (四)每分地施堆厩肥二千五百台斤，或人糞尿三千五百台斤。  
 (五)用人糞尿為主，每次約一百磅，或用硫酸銨每次三十台斤，追肥三至五次。  
 (六)水量保持土面上約一公尺深度，太深會影響發育。  
 (七)揭斑病和疫病較多，可噴佈大生五百倍液預防。  
 (八)栽後二百五十天至三百天才能收穫。  
 (九)不要培土。  
 (十)整地方法和栽植水稻相同，追肥前應行排水除草，追肥三天後再灌水，如有側芽應摘除使母芋肥大(鳳山園試分所)



請認明豐年牌商標是品質最佳之標記

**水稻·果樹·病蟲害之防治**

富粒多 M  
 蟲必死粉劑  
 必殺松  
 特快殺  
 賽文  
 甲基巴拉松  
 蘇生銀水和劑  
 新綠寶水和劑  
 稻熱病藥劑  
 (西樂生石灰)



**豐年牌農藥**  
 的效果

為何年年收成那麼好？

興農化工股份有限公司  
 臺中縣大里鄉內新路59號  
 電話：5087·5088·5089