



依必安·多穗·阿蘇仁

可否混合的問題

【問】：貴刊十五卷十二期十二頁，植物保護推廣新方法中，稻紋枯病與鐵錳防治時期相同，「多穗」、「阿蘇仁」等可與「依必安」等混合施用，但五十四年植物保護推廣方法小冊內之農藥混合表及農化工廠編印病蟲害防治口冊中，「多穗」和「紋絕」均不可與「依必安」混合，未知那個正確？（臺中外地鄉永豐村六分路三一號徐煥炎）

【答】：（一）依必安與「多穗」或「紋絕」混合後立即施用，對於各該藥之藥效似無太大影響，但不宜混合後久置再用。若干紋枯病藥劑如「阿蘇仁」為避免藥害，在加工時加入有機鐵化合物，此項鐵質對有機磷劑經久能起化學變化，故不宜混合久置再用。

（二）「多穗」和「紋絕」在推廣之初，使用高濃度稀釋液，需加石灰以減少藥害，為顧及部份農民仍有加用石灰，如再與「依必安」混合將影響藥效，故經考慮後農藥混合表仍採用「不可混合」較為妥當。（洪維懷）



鷄羣發生霍亂症

緊急注射免疫血清

【問】：（一）鷄羣發生霍亂，每天都有鷄鴨死亡，經採用一百四西家禽霍亂疫苗混合二瓶鐵錳素注射，迄今十多天不見再有死亡，請問如此防治可以嗎？會不會減低效力？會不會縮短免疫期？（二）鷄球蟲病要怎樣防治？何藥最有效？（彰化溪湖鎮大竹里影路八四號徐朝陽）

【答】：（一）鷄羣如果確是發生鷄霍亂，最好注射免疫血清作緊急防治，治療藥以土黴素的效力最好，其他磺胺甲噁啶（Sulfamerazine）磺胺（甲噁啶）（Sulfamethazine）

效力亦高。療藥如和疫苗或血清同時應用時，最好分開注射。鐵錳素普通對鷄霍亂治療效力不大。

（二）治療鷄球蟲病的藥，如磺胺嘧啶或磺胺二甲噁啶放在飼料內（〇·四四〇）或其鈉鹽放在飲水內（〇·二〇）連續飼喂三天有良好效力。市售球蟲病藥很多，不及介紹，可到附近畜畜用藥店詢問。（李培元）

四季檸檬管理得當

全年均可開花結果

【問】：（一）四季檸檬品種比「尤利加」種之產量和品質如何？（二）四季檸檬是否全年開花結果，栽植上應注意些什麼？（三）何處有種苗出售？（四）栽培檸檬有何參考書？何處有售？（嘉義市後湖里七九號王國）

【答】：（一）四季檸檬即指「尤利加」種檸檬，「尤利加」種檸檬如施肥修剪等管理得當，週年可開花結果。

（二）栽培檸檬在主幹及主枝構成後，如放任不管，易萌出細長枝條，故應誘引細枝橫向。又在適當處加以修剪，使強枝發出，樹冠內填滿充實枝葉亦可。

（三）檸檬每株施肥量如左表：

肥料種類	二十一年至二十六年	二十六年至二十九年	二十九年以上
完熟堆肥	三、五〇〇	四、〇〇〇	一、五〇〇
大豆餅	一、七五〇	三、五〇〇	七、五〇〇
硫安	二、二五〇	六、五〇〇	一、一〇〇
過磷酸鈣	三、五〇〇	四、〇〇〇	九、〇〇〇
硫酸鉀	共七五〇	一、七五〇	三、七五〇

上述肥料在十二月施二分之一，三四月施四分之一，七、九、十月施四分之一。

（四）目前尚無檸檬專書，可參考農家便覽柑桔栽培學或臺灣果樹誌（翁仁祿）

10,000 倍落果防止劑！



衷誠感謝農友愛顧！

敬請繼續協助賜教！

1 萬倍速效性展着劑

愛 展



英國植物保護公司榮譽出品

臺灣經銷 華貿易股份有限公司

臺北市民生東路232號(臺北市郵政信箱1764號)

享譽已久 公認的效力

福利來



新貨已到 即請購用

Furella 'フレラ'



鷄白痢的特效藥「福利來」為供應新雞育成的成功特別實行八折大優待。每罐一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。

各地飼料行均售「說明書備索」

總代理：英商卜內門工業有限公司
臺北市中正路一八〇〇號
經銷處：國際畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號