

農業信箱



治香蕉葉斑病礦物油

臺中高雄青果社有售

【問】：貴刊十五卷十七期三十九頁徐茂樟先生發表防治香蕉葉斑病藥劑，但本地買不到，請告知批發處詳址，以便直接批購。

【答】：防治香蕉葉斑病藥劑「大生M二十二」及「出來通X—一四」係臺北市中正路一七五號三樓，青果貿易公司代理，本省各農藥零售商均有銷售。「蕉克利」係由彰化市平和莊五十五號裕合企業公司農業工廠代售。

農用礦物油有兩種：
Shell Spray oil 由臺北市中正路一七五號二樓五豐化學工業公司代售。
Easo Spray oil 由臺北市長安西路一八九號麒麟公司代售。

前項藥劑除向前列廠商購買外，臺中及高雄青果社也有代售。（徐茂樟）

水稻生育期管理

注意防止稻熱病

【問】：（一）近年來高雄六龜鄉地區的單季水田，二期作水稻在第二次中耕除草後，大部份發生嚴重葉斑病。請問該病之發生，是否與除草時切斷根羣而引起有關？（二）中耕除草或以殺草劑處理能促進生育增產嗎？（三）請告知適合本地單季水田栽培的優良蓬萊稻品種。（高雄六龜鄉民生路八一號溫德德）

【答】：（一）在水稻第二、三次中耕除草時期，因稻株生育旺盛，根羣發達，實隙中排除草時常會切斷稻根，致部份稻根無法吸收養份與水份，生育一時停止，植物體體弱為衰弱，極可能誘發稻熱病。


（二）水稻中耕除草後，一般常晒田二三日，促進土壤內空氣流通，有機質分解迅速，也可能促進稻熱病之發生。

高粱臺中一、二號 適合桃園春作栽培

【問】：（一）貴刊十五卷十七期所刊載難交高粱臺中一、二號兩品種，是否適合桃園地區春季栽培？（二）應在何時播種較佳？（三）收穫時期何時？每公頃收穫約有多少畝斤？當時市價多少？（桃園大園鄉三石村三六號蔡榮枝）

【答】：（一）難交高粱臺中一及二號，均適合桃園地區春作栽培。

（二）春作高粱最適播種期為三月下旬至四月上旬，惟高粱大部份栽培於旱田，若在此期間無降雨，延至五月上旬亦可播種。



柑桔果樹蔬菜病蟲害 防治藥劑總匯!!!

各種藥劑備有說明書函索即寄

日農高級夏油95 防治：柑桔：有殼、無殼介殼蟲。 香蕉：葉斑病。
(特製スケルシン)

日農地特靈乳劑 防治：柑桔、木麻黃：星天牛及天牛產卵。

日農卡羅仁合劑 防治：柑桔：紅寶石臘蟲 (ルビーロー蟲) 煤病、青苔蟲。

日農殺爾頓75 防治：柑桔：銹蟬、象皮病、紅蜘蛛、火燒柑。
(サルトン)

日農DDVP乳劑 防治：蔬菜：青蟲、夜盜蟲、粉蛾、絲蟲、葉蜂。

日農汎水銀波爾多 防治：柑桔：黑點病、瘡痂病、潰瘍病。
(パン水銀ボルドー)

日農新殺蟬卵乳劑 防治：柑桔及蔬菜：紅蜘蛛的成蟲、幼蟲、卵、與石灰硫黃合劑混合使用效果特優。
(ネオ・サツピラン乳劑)

日農特製砒酸鉛 防治：水梨：捲葉蟲、毛蟲、食心蟲、縫衣蛾。 柿：柿蒂蟲、毛蟲、金龜子。

KDF 加巴美水和劑 50% 防治：柑桔：角盾瘿象、粉刺介殼蟲、吹粉介殼蟲、桔花潛蠅。 櫻果：頭巾浮塵子、煤紋病。
(カーパーメート水和劑)

日農水銀波爾多 防治：蔬菜疫病、炭疽病、褐斑病。
(水銀ボルドー)

ORTHO 福爾丹 防治：柑桔：瘡痂病、黑點病。

ORTHO 好速殺 防治：果樹、蔬菜：各種病害特效藥

山德士愛克司B50 防治：柑桔一切果樹：潛蛾、蚜蟲、捲葉蟲、粉蟲

日農新利農展着劑 施用農藥時加入少許新利農展着劑可賦與藥液之懸垂性、擴展性及附着性之性能。是用少許金錢來增加高貴農藥的藥效。
(日農新リノー展着劑)

日農殺蝸劑餌劑 防治：蝸牛、軟蛭、蛞蝓。
(ナメキール)


日農阿特靈乳劑 防治：各種土壤害蟲。

ORTHO 富賜靈 防治：茶樹其他作物害蟲。

進出口商

泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路2段108號 電話：44994



茶樹發生病蟲害 申請保護站配藥

【問】：茲寄上茶葉標本請鑑定是何病蟲？約廿天後可採摘，但此病傳播甚速，去年曾枯死約二十多，請速告防治方法。（本欄指南村樟樹三號張清富）

【答】：(一)所寄標本過時已久，不易判斷，極可能是受錫蘭茶蜘蛛為害，此蟲很小肉眼較難看到，均寄生在茶葉的背面，受害嚴重時幼嫩枝梢亦有寄生，受害枝或葉逐漸枯死，尤以旱季發生為多。

(二)可用「開路生」或「鐵地旺」可濕性粉劑加水八百倍防治，噴藥時應注意將藥液噴到茶樹中心及葉背。

(三)可向鄉公所茶樹保護工作站請求勘查，申請配藥。（胡家儉）

芥藍胡瓜新種有售 結球高苣洗淨生食

【問】：(一)白花芥藍種子何處有售，約多少錢？

(二)松風胡瓜種子每包三十元，有多少粒？其形狀及重量多少？

(三)結球高苣如何生食法？何處有售優良種子？（桃園蘆竹鄉坑口村頭前五號陳順吉）

【答】：(一)白花芥藍種子臺北市施化街一段臺灣農產企業公司有出售，每包兩五元，貴地種子行應有種子出售。

(二)松風胡瓜每包二十公克，每十公克有種子二百粒，故每包有四百粒，因係小胡瓜品種，故對日照的感應可列為中等。每十公克產量有二十四百一千六百公克。臺北市信義路三段臺灣農產服務社有售種子。

(三)結球高苣生食的方法，是將葉球洗淨後切開或用手剝葉，加上醋與醬油或マヨネーズ等食用，種子宜向三重市重新路三段興農種子行洽購為佳。（王進生）

稻田除草時施肥 有全層施肥功效

【問】：以前曾推行整地時稻田全層施肥，但事實上民間極少採用，是否因此法無實用價值？又在同一環境條件下，粗肥後全層施肥與不全層施肥的脫氮作用及肥料損失，何者為多？（陳祥生）

【答】：目前一般水稻田施肥方法，多在中耕除草時施用，當施肥後行除草工作時，大部份肥料已充分與土壤混合，同時已有絕大部份肥料進入土壤氧化層低下，如此已降低了脫氮的可能性，故此方法亦具有全層施肥之意義，若在整地時施肥，溶於田面水中之肥料成分，有可能隨水而流失，招致減低施肥的功效。（吳啓東）

可可椰子適合南部栽培

【問】：栽培椰子以採果為目的，應種何種經濟價值較高？需幾年才有收穫？種植時是否與果樹一樣，要施基肥？（臺東成功鎮和平里延平路一號孫彥波）

【答】：本省南部如屏東、高雄及臺南等三縣向適于可可椰子栽培，本省各地海岸當風處，並非理想栽培地，其主要經濟價值為採收椰子果實，可可椰子栽植以後，多數在七、八年開始結果，至十五年以後開始豐收，如果管理適當，每年多有固定產量，直至七、八十年。栽培椰子應該以經營果園方法細心管理。要椰子豐收，必需充分施肥。在沙酸性土壤宜用石灰配合鉀肥改良。在沙土宜大量施用有機質肥料，以保持水份及養份，並用富有鉀質之完全肥料。此外在椰子樹下，種植綠肥對於沙土亦有顯著功效。在黏質沖積土，可混用河沙及堆肥。在貧瘠之紅土，宜施用大量含有氮、磷、鉀之有機肥料。

普通在沙土上每株椰子樹，每年需施用廐肥或堆肥一百磅，草木灰二十至四十磅，骨粉二磅（一磅約等於十二臺兩多）。在缺乏有機質之土壤，每年每株可施用豆餅或花生餅，草木灰四十磅，骨粉二磅。（江漢）

請選用最可靠之.....

日本イハラ
臺灣庵原



中日合資・歷史悠久・信譽卓著的

各種殺蟲，殺菌劑

馬力	重乳	劑50
立斃(DDVP)	乳	劑50
甲基巴拉松	乳	劑40
巴拉松	乳	劑46.6
安飛特	乳	劑19.5
安飛達	乳	劑20
サルウエット	水和	劑90
新阿蘇仁	液	劑6.5



臺灣庵原農藥股份有限公司
臺北市承德路83號8樓 電話：51023・52023

