



茶樹發生病蟲害 申請保護站配藥

【問】：茲寄上茶葉標本請鑑定是何病蟲？約廿天後可採摘，但此病傳播甚速，去年曾枯死約二十多，請速告防治方法。（本欄指南村樟樹三號張清富）

【答】：(一)所寄標本過時已久，不易判斷，極可能是受錫蘭茶蜘蛛為害，此蟲很小肉眼較難看到，均寄生在茶葉的背面，受害嚴重時幼嫩枝梢亦有寄生，受害枝或葉逐漸枯死，尤以旱季發生為多。

(二)可用「開路生」或「鐵地旺」可濕性粉劑加水八百倍防治，噴藥時應注意將藥液噴到茶樹中心及葉背。

(三)可向鄉公所茶樹保護工作站請求勘查，申請配藥。（胡家儉）

芥藍胡瓜新種有售

結球高苣洗淨生食

【問】：(一)白花芥藍種子何處有售，約多少錢？

(二)松風花胡瓜種子每包三十元，有多少粒？其形狀及重量多少？

(三)結球高苣如何生食法？何處有售優良種子？（桃園蘆竹鄉坑口村頭前五號陳順吉）

【答】：(一)白花芥藍種子臺北市施化街一段臺灣農產企業公司有出售，每包兩五元，貴地種子行應有種子出售。

(二)松風胡瓜每包二十公克，每十公克有種子二百粒，故每包有四百粒，因係小胡瓜品種，故對日照的感應可列為中等。每十公克產量有二十四百一千六百公克。臺北市信義路三段臺灣農產服務社有售種子。

(三)結球高苣生食的方法，是將葉球洗淨後切開或用手剝葉，加上醋與醬油或マヨネーズ等食用，種子宜向三重市重新路三段興農種子行洽購為佳。（王進生）

稻田除草時施肥 有全層施肥功效

【問】：以前曾推行整地時稻田全層施肥，但事實上民間極少採用，是否因此法無實用價值？又在同一環境條件下，粗肥後全層施肥與不全層施肥的脫氮作用及肥料損失，何者為多？（陳祥生）

【答】：目前一般水稻田施肥方法，多在中耕除草時施用，當施肥後行除草工作時，大部份肥料已充分與土壤混合，同時已有絕大部份肥料進入土壤氧化層低下，如此已降低了脫氮的可能性，故此方法亦具有全層施肥之意義，若在整地時施肥，溶於田面水中之肥料成分，有可能隨水而流失，招致減低施肥的功效。（吳啓東）

可可椰子適合南部栽培

【問】：栽培椰子以採果為目的，應種何種經濟價值較高？需幾年才有收穫？種植時是否與果樹一樣，要施基肥？（臺東成功鎮和平里延平路一號孫彥波）

【答】：本省南部如屏東、高雄及臺南等三縣向適于可可椰子栽培，本省各地海岸當風處，並非理想栽培地，其主要經濟價值為採收椰子果實，可可椰子栽植以後，多數在七、八年開始結果，至十五年以後開始豐收，如果管理適當，每年多有固定產量，直至七、八十年。栽培椰子應該以經營果園方法細心管理。要椰子豐收，必需充分施肥。在沙酸性土壤宜用石灰配合鉀肥改良。在沙土宜大量施用有機質肥料，以保持水份及養份，並用富有鉀質之完全肥料。此外在椰子樹下，種植綠肥對於沙土亦有顯著功效。在黏質沖積土，可混用河沙及堆肥。在貧瘠之紅土，宜施用大量含有鉀、磷、鉀之有機肥料。

普通在沙土上每株椰子樹，每年需施用廐肥或堆肥一百磅，草木灰二十至四十磅，骨粉二磅（一磅約等於十二臺兩多）。在缺乏有機質之土壤，每年每株可施用豆餅或花生餅，草木灰四十磅，骨粉二磅。（江鴻）

請選用最可靠之.....

日本イハラ
臺灣庵原



中日合資・歷史悠久・信譽卓著的

各種殺蟲，殺菌劑

馬力	重乳	劑50
立斃(DDVP)	乳	劑50
甲基巴拉松	乳	劑40
巴拉松	乳	劑46.6
安飛	靈	乳劑19.5
特佈	達	乳劑20
サルウエット	水和	劑90
新阿蘇仁	液	劑6.5



臺灣庵原農藥股份有限公司
臺北市承德路83號8樓 電話：51023・52023