

農業信箱



小麥臺中卅一臺南三號

適合雲林地區栽培

【問】：(一)請問適合雲林地區栽培的小麥品種有那些？何處可買到種子？
(二)每分地播種量需多少？(雲林麥寮鄉大灣一三號楊扶)

【答】：(一)目前適合雲林地帶栽培的小麥品種，有臺南三號及臺中三十一號，不久將來新優良品種(抗病豐產)之臺中三十三號及臺南四號亦將推廣。

(二)小麥每分地直播量，約六十八公斤，臺南品種可向雲林縣農會洽購。臺中品種可向臺中縣市各農會洽購。(王祖壽)

雲林區糊仔甘諸

可種新竹一號等

可種新竹一號等

【問】：雲林地區適合糊仔栽培甘藷品種，以何種最佳？無灌溉水之地區，又以何品種產量最高，種苗何處可買到。(雲林古坑鄉朝陽村文淵路一三八號邱夫成)

【答】：(一)雲林地區糊仔栽培的甘藷，一般以在來種「紅心尾」及「烏屎種」塊根產量最高，但此二品種品質均不良，據過去試驗結果，如用改良糊仔栽培，則以「臺農五十九號」與「新竹一號」等塊根產量較高，而一般糊仔栽培則以「臺農六十號」與「新竹一號」等產量較多。

(二)無灌溉水之地區，以「紅心尾」品種產量最高。

(三)「新竹一號」係新竹區農業改良場育成品種，「臺農五十九號」與「臺農六十號」係嘉義農業試驗分所最近育成新品種，種

諸須待明年三月間才可供應(筒金寬)。

香蕉風災救助金核發中

【問】貴刊曾歡迎蕉農提出有關產銷的任何意見，茲有關本年度「哈莉」及「瑪麗」

颱風受害蕉農。政府早經呼籲被害蕉農提早追肥管理，以期恢復生產，並頒佈補助辦法，蕉農亦已辦好果房驗收，但至今未見任何消息，受災蕉農們祈待該款早日發放，以便早日投入恢復生產，以免延誤失却補助意義，故請貴社代為轉達各有關機關，祈能提早發放該款，以維信譽，以利增產，無限感激！(雲林土庫鎮奮起一七號鄭習)

【答】：本年度「黛納」、「哈莉」、「瑪麗」颱風，三次侵襲本省，蕉園受害頗重，政府為促進風災互助，並加速恢復後生產，曾頒佈香蕉風災救助辦法，並於災後辦理果房驗收工作，由各生產團體將受災名冊送經農林廳核查後，轉請外貿會香蕉輔導小組撥發救助金。現「黛納」、「瑪麗」颱風救助金共計臺幣貳百零拾柒萬餘元，已核准，並已分發蕉農；「哈莉」颱風救助金共計臺幣貳百零玖萬餘元，業經農林廳核定後轉請香蕉小組核撥中；至於「瑪麗」颱風，因青果合作社及省農會所送名冊略有錯誤，經退回修正，現正由農林廳審查中，日內即可轉請小組撥款。(吳國璋)

蘆筍冬種與春種

產量差異不大

【問】：(一)在本二期水稻收穫後種植蘆筍，與明年春季種植，其收益何種較快？
(二)北部蘆筍發育到幾月才停止？
(三)本人深信貴社，故想請貴社代辦選擇優良種苗可否？(桃園蘆竹鄉內厝二七號張福全)

【答】：(一)二期水稻收穫後種植蘆筍與明春三月種植蘆筍，兩者的差異不大，因十一月下旬水稻始能收穫，此時氣溫已低，蘆筍生育較慢。(注意水田種植蘆筍應慎重考慮)

全省公認的效力！



豐年牌

豐年牌農藥

- 品質最佳
- 信用可靠
- 價錢便宜
- 服務週到

果樹·蔬菜·病蟲害之防治

蘆	農	樂	甲	賽	殺	馬	保	强	富	除
筍	家	農	基	巴	蟲	拉	必	力	速	蟲
福	福	家	拉	文	淨	松	安	保	靈	菊
			松					必		



興農化工股份有限公司
臺中縣大里鄉內新路59號
電話：五〇八七·五〇八八·五〇八九

要撒在稻莖基部

【問】：(一)本地二期稻作，受稻飛蟲及浮塵子爲害極爲嚴重，有的剛出穗就全區或部分枯死，減收或全無收成，其實並非無防治，而常聞藥劑無效之嘆息聲，故本人有下列數點疑問：

(一) 請問在目前防治上，損害蟲以何種藥劑最有效？一% BHC 與一·五% 賽文粉劑何者較好？

②據植物保護推廣方法中，防治水稻螟蟲可用3%B.C粉劑散於水田中，要稻出有三至五公分水柱方有效果，且應保持十天水位等，但如用1%B.C粉劑防治稻飛虱與浮塵子時，是否亦該如此？

(3) 用 1% BHC 粉劑防治旱作之落花生或油菜等之「龜神」是否可以？（斗南鎮朋昌里五間厝七五號林坤海）

【答】(一)防治稻飛蟲，用1%BHC

粉劑，應該有良好中防治效力，唯撒藥時，應特別注意將藥粉撒在稻莖基部（稻稱基部），約離地面二十公分內，因稻飛蟲之成蟲

與若蟲，多羣集爲害此處，故如將藥粉撒在空中、葉上、地面的或水，雖然屢次施藥或藥量用很多，對稻飛蟲均不會有良好的防治效

藥量用得多。對於大田，尤宜注意。故在此特別建議各地農友，如採用粉劑防治稻飛蟲時，一定要用撒粉器撒藥，才容易將藥撒在稻莖基部，人工徒手撒布工作得

困難，不如改用乳劑或可濕性粉劑，加水用噴霧器噴射，工作較方便而有效。

如稻飛蟲與浮塵子同時發生時，最好採用 D T 或賽文或治螟蟲藥劑可一併得到防治。

(三)防治稻飛蟲如採用BHC粉，最重要
的是將藥粉撒在稻莖基部，而不可採用防治

用法，將藥粉撒在水中。

(四) BHC 粉對蚜蟲(龜神)也有些防治效果，但蚜蟲均在菜心，葉背及花蕾上爲害，且 BHC 之惡臭易遺留於收穫物中，所以一般均不採用。(張良傳)

治香蕉象鼻蟲「蕉特靈」

青果合作社有供應

【問】：(一)「大生四五」與「大生廿二」何差別？何處有售？

「(二)使用「大生廿二」防治香蕉「葉斑病」是否可以？」

（三）「農用礦物油」是不是夏油乳膏？
（四）「大生四五」或「大生廿二」加農用
油的混合比例如何？

(四)防治香蕉象鼻蟲的「蕉特靈」何處有？
(五)新竹縣新埔鎮旱坑里六八號黎水金

【答】：(一)「大生廿二」主成分是「鋅」，「大生四五」是「鎂」和「鋅」，「大生八」是「鎂」換言之「大生四五」具有

七八」是「鉤」揀言之「大生四五」與「大生廿二」和「大生七八」的成分。「太四五」尚在試驗階段，還沒有農藥登記，

(二)「大生廿二」可以防治香蕉葉斑病，

公頃用一大生廿二・二五公升加壓剉
「出來通×一一四」八十公撮，加水二五
公升，以微粒動力噴霧器噴射香蕉心葉及

公升，以微粒重方。如用噴霧器噴射時，要加五公升的水。

(三)防治香蕉葉斑病的「農用礦物油」是供香蕉用的，而「夏油乳劑」是供介殼蟲治用的，兩者油的稠度和淨度都不同。

(四)「大生廿二」加農用礦物油的比例，以五十四年香蕉葉斑病暫行防治方法爲「大生廿二」加農用礦物油三公分。

(五)「蕉特靈」是防治香蕉象鼻蟲幼蟲的藥劑，如香蕉葉上發現象鼻蟲幼蟲爲害

藥劑，如在香蕉莖上發現象鼻蟲幼蟲爲害，應整流膠（或有洞孔）時，以「蕉特靈」加水一千倍，用人力噴霧器裝上注射針注射於被

善部位，每株注射稀釋藥液二百七十——二百五十公撮。「蕉特靈」及注射針，可到青果合作社面洽，無誤。

（余茂璋）

最可靠有信用的 DDVP 乳劑。
為照顧全省民衆食用蔬菜、水果的
安全、推薦農友，採用本藥劑防治
蔬菜、茶、水果害蟲。



デーデービーピー
日農 DDVP 乳剤

日農滴滴微皮乳劑

農林廳農藥登記證第274號

包裝：100c.c. 500c.c.

防治範圍：

蔬菜：青蟲、夜盜蟲、小菜蛾、菜螟蟲、蚜蟲。

油菜：蚜蟲（飛蠅）

柑桔：紅蜘蛛、蚜蟲、椿象、介殼蟲類。

洋菇：消毒菇床、防治跳蟲、菇蠅等。

特點：本劑係速效性藥劑，因具有急速分解之特性，故對於需要毒性消失快速之蔬菜、茶、水果等作物，用於收穫三、四天前之撒佈最為適當又安全

進口現貨供應 泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路2段108號

電話：44994

製造廠 日本農藥株式會社
東京・大阪

防治蘆筍金針蟲

用「阿特靈」或「飛佈達」

【問】：最近在蘆筍園發見有一種如標本的害蟲，潛入土壤中近根部處。請問：

(一)此種正名及日名何物？

(二)是吸取根部營養分或直接咬斷根部？

(三)可用何種藥劑防治？用「ヘプタ」可以嗎？怎樣施用？(大甲鎮文武里德興路三十六號劉朝輝)

【答】：(一)所寄來害蟲標本不是金針蟲，俗稱鐵線蟲，就是叩頭蟲(捲米龜)的幼蟲，日名叫「ハリガネムシ」。

(二)金針蟲多潛伏在土中蛀食作物地下部，不是吸取養分。

(三)此蟲除害蘆筍根部外，常會鑽入地下莖，尤其嫩莖中蛀食。

【防治金針蟲】：應該在種植蘆筍前，施土中才有良好效力，已種蘆筍之地如發現有金針蟲為害，也可再施藥防治，每分地用四十多阿特靈可濕性粉一合升，或二·五多飛布達四·五公升，平均撒施植株下，並立即用鋤頭入拌土中四、五寸深，可防治之。(張長傳)

【問】：(一)晚生橙類如晚命西亞，在北部之臺北近郊或近宜蘭地方，可否大量栽培，或栽培何類為佳？

北部種柑金柑

株距依種類而異

【問】：(一)晚生橙類如晚命西亞，在北部之臺北近郊或近宜蘭地方，可否大量栽培，或栽培何類為佳？

(二)柑橘種植距離多少最適當？近來有人說密植留果至形擁擠時再行間伐，不知其法可行否有缺點嗎？(基隆市中正路一〇八之二號陳玉麟)

【答】：(一)晚生橙類如晚命西亞等，在臺北或宜蘭附近不適栽培。由於本省北部開花及結果初期雨水過多，故落花與落果現象嚴重，加之颱風後潰瘍病之發生頗嚴重，不該大面積種植。北部地區仍栽培柑與金柑為宜。

(二)柑桔之株距仍依地力、山坡斜度及品種等而有異。目前農林廳農復會之推廣標準，柚子為二十四×二十四公尺。甜橙為二十×二十二公尺。椪柑、桶柑為二十×二十公尺。檸檬為十八×十八公尺。金柑為十五×十五公尺。如地力較瘦或根盤等弱勢苗木，植距可稍縮小。

計劃密植法僅限於平坦且富有人工之地區實行。計劃密植栽培法請參照本刊十四卷二十期十一頁。(翁仁祿)

鞣製兔毛皮幾個問題

【問】：(一)鞣製兔毛皮水漬時容易發臭，毛常脫落，請問要加什麼藥品，或有其他較好方法？

(二)剝裏的工作真難做，請問用什麼工具或有較好的方法？

(三)兔仔在飼養中，易使毛色不潔白，請問用漂白粉漂洗，是否可以漂白，或用什麼藥品處理？

(四)鞣製好的毛皮，肉面變黃色，請問是否鞣製不當？有什麼方法補救使肉面白色？(苗栗苑裡鎮新復里九一號莊玉松)

【答】：(一)水漬毛皮時主要是經常換水，否則會臭，不用什麼藥品。

(二)剝裏用刀口不銳的刀，要仔細的做，沒有什麼好方法，多做就易了，平平的放在一塊木板上，用刀輕刮。

(三)兔仔在飼養時應注意清潔，不可有糞尿污染了毛，否則不易洗除，這種不白的毛皮價值低。

(四)毛皮內面變黃是鞣製不完全所致，可能鞣製的一階段時間不夠，鞣製後磨底，該是灰白色。(黃立華)


番石榴多產果實

需要肥料水份充足

【商】：請問東部所栽的中山月拔，會使用充足的化學肥料及自給肥料，且曾剪定，為何果實總不如西部的大，是何原因？是土壤欠缺某種微量元素或氣候的關係？(花蓮吉安鄉化仁村化仁一八〇號廖萬池)

【答】：本省一千公尺以下的地區栽培

永興牌輕油發動機



最信用，最可靠，最標準
外銷國產品，臺灣省合作
金庫及臺糖公司特推推薦
，合約採用可獲分期付款
。(北部顧客請連絡臺北
營業處)

專門製造

抽水機	發動機	馬力	保證效果
3吋	3-4馬	8-10.5	省油耐用
4吋	4-6馬	13-15	物美價廉
5吋	6-8馬		
6吋	8-10.5馬		
8吋	13-15馬		

※中日技術合作，嚴格品質管制，榮譽出品。
※中央標準局註冊商標，申請註冊在案。
※臺灣省檢驗局，性能檢驗報告確到國際標準。

永興造機股份有限公司

(TEL 2171) 號 111 路 愛仁市義嘉：司公總
(TEL 53371) 號 326 路西安長市北臺：處業營北臺

來福利



新貨已到
即請購用



雞白痢的特效藥「福利來」為供
應新雞育成的成功特別實行八折
大優待。
每罐一筒月祇花八角藥費，保證
百發百中，既可安心又可獲利。

各地均有代售

「說明書備索」


享譽已久
公認的效力

Furella
'フレラ'

總代理：英商卜內門化學工業有限公司
經銷處：國際藥房
臺北市中正路一八〇〇號
臺北市長安東路一段三九號

榮獲世界
十三國
專利權

用一元
賺十元



久保柑桔新鮮 減少貯藏損失10%

- 保持柑桔原來的水份和色香。
- 保持柑果糖份、酸度及其他果汁成份。
- 使柑桔鮮艷美麗，增加價值。
- 長久貯藏，減少失重及腐爛損失。
- 人畜無害。

(文獻備索)

柑桔、果菜保鮮劑

沃溢滴 OED-100

台聯藥品公司 TEL:47436
台北市南京東路二段29號

番石榴，都很適宜，要維持高產量和大果形，必須具備充分的肥料和土壤水分。員林一帶的番石榴產量高和果形大，就是因為那裡的土壤肥沃，土壤水分很充足的關係，在天氣乾燥時期所結的果實，一般都較小。但如能給予人工灌溉時，果實仍可結得很大。你施的肥料雖然很多，但如施肥時期的天氣很乾燥，果實的發育仍將受到影響，而不會結得很大。花蓮地區多雨，適合生產冬春的番石榴，這時期的價格很高，可增加農民的收益。(張振市)

電石處理鳳梨

應在晚間實行

【問】：(一)現在是電石處理的末期，時間已很迫切，但天不下雨，水源不便，該如何補救？

(二)電石處理為何要在晚間？

(三)白天處理效果如何？

(四)白天和晚上處理，其效果比較何者為佳？

(五)如何處理才能得到最高之效果？
(六)對鳳梨果肉的影響如何？
(七)電石水處理和電石處理，何者為佳？
(八)電石水該白天或晚上處理為佳？(彰化鎮山脚里一八號陳德吟)

【答】：(一)鳳梨園如水源不便，可採用電石粉處理，每株用量〇·五至一·〇克，施於鳳梨根部即可。
(二)電石處理要在夜間舉行，因夜間氣溫較低，處理之效果較高。
(三)白天處理一般效果均比夜間處理相差約半以上。
(四)夜間處理效果較佳。
(五)為提高處理效果，應行處理二次比較安定(第一次處理後隔一星期再行第二次處理)。

(六)電石處理產生果實與一般果實之品質並無差別，但處理時期對品質有關係。
(七)電石水較佳。
(八)不論電石水或電石粉，均在早晨太陽

出以前處理為佳。(黃榮瑞)

末上京以前處理為佳。(黃榮瑞)

初產母猪冬季配種 減少日本腦炎感染

【問】：貴刊九月十五日刊載有關豬之日本腦炎防疫，請問：(一)該日本腦炎疫苗本省是否可購到，何處有售？

(二)是否有必要從日本聯絡進口或訂購？(高雄市民區建興街四四之四號陳秋雄)

【答】：(一)日本腦炎疫苗，現在由省畜衛生試驗所試驗製造研究中，待該所試驗結束，確認有效後即可正式製造販賣，供一般用戶做為日本腦炎預防之用。
(二)日本腦炎沒有正式進口供應，可否進口請洽詢有關機關。豬日本腦炎常發生於第一胎(有百分之九十以上)，第二胎以後就很少發生，故第一產母豬之配種最好選冬天(十二月—一月)蚊子較少發生時期，就可減少日本腦炎之感染。(張聯欣)

服務最好，零件充足，本省銷量最多。

西德製

爽樂牌動力噴霧器

- 農復會推薦，高雄區、臺中區青果合作社大量採購，防治葉斑病。
- 農林廳、糧食局，舉辦共同防治隊採用噴水，舉數最多。



主要進口貨品

野馬發動機，竹下耕耨機，有光高壓噴霧機，動力穴掘機，一次精米機，稻谷乾燥機，飛馬汽油引擎。

竹下農機公司

本公司：臺北市武昌街2段118號之1
電話 33320

臺中保發廠：臺中市北屯路245號
電話 5178

