

要撒在稻莖基部

【問】：(一)本地二期稻作，受稻飛蟲及浮塵子爲害極爲嚴重，有的剛出穗就全區或部分枯死，減收或全無收成，其實並非無防治，而常聞藥劑無效之嘆息聲，故本人有下列數點疑問：

(一)請問在目前防治上項害蟲以何種藥劑最有效？一% BHC 與一・五%賽文粉劑何者較好？

(二) 據植物保護推廣方法中，防治水稻螟蟲可用三% B.H.C. 粉劑散於水田中，要稻田有三至五公分水，方有效果，且應保持十天水位等，但如用一% B.H.C. 粉劑防治稻飛虱與浮塵子時，是否亦該如此？

(1) 用 1% BHC 粉劑防治旱作之落花生或油菜等之「蠟神」是否可以？（斗南鎮明昌里五間厝七五號林坤海）

【答】(一)防治稻飛蟲，用1%B.H.C粉劑，應該有良好中防治效力，惟撒藥時，應特別注意將藥粉撒在稻莖基部（稻稈基部）

，約離地面二十公分內，因稻飛蟲之成蟲與若蟲，多羣集爲害此處，故如將藥粉撒空中、葉上、地面的或水，雖然屢次施藥

空中、第一、地面均不會有良好防治藥量用很多，對稻飛蟲均不會有良好防治力。故在此特別建議各地農友，如採用粉防治稻飛蟲時，一定要用撒粉器撒藥，才

防治稻飛虱時，一定要用粉劑。粉劑易將藥撒在稻莖基部，人工徒手撒布工作困難，不如改用乳劑或可濕性粉劑，加水噴霧器噴射，工作較方便而有效。

(二)BHC對稻浮塵子沒有防治效力，如稻飛蟲與浮塵子同時發生時，最好採用DT或賽文或治螟蟲藥劑可一併得到防治。

(三)防治稻飛蟲如採用BHC粉，最重的是將藥粉撒在稻莖基部，而不可採用防

噴蟲方法，將藥粉撒在水中。

(四) BHC 粉對蚜蟲(龜神)也有些防治效果，但蚜蟲均在菜心，葉背及花蕾上爲害，且 BHC 之惡臭易遺留於收穫物中，所以一般均不採用。(張良傳)

治香蕉象鼻蟲「蕉特靈」

青果合作社有供應

【問】：(一)「大生四五」與「大生廿二」何差別？何處有雋？

是否可以用？

(三)「農用礦物油」是不是夏油乳劑？

(四)防治香蕉象鼻蟲的「蕉特靈」何處有

【答】：(一)「大生廿二」主成分是「鋅」

「大生四五」是「錳」和「鋅」，「大生七八」是「錳」換言之「大生四五」具有

大生廿二」和「大生七八」的成分。「大生廿二」尚在試驗階段，還沒有農藥登記；

(二)「大生廿二」可以防治香蕉葉斑病

公頃用「大生廿二」二・二五公斤加展葉
「出來通×一一四」八十公撮，加水二

公升，以微粒動力噴霧器噴射香蕉心葉葉片，如用人力噴霧器噴射時，要加

防治香蕉葉斑病的「農用礦物油」

供香蕉用的，而「夏油乳劑」是供介殼蟲治用的，兩者油的稠度和淨度都不同。

(四)「大生廿二」加農用礦物油的比例

(五)「蕉特靈」是防治香蕉象鼻蟲幼蟲

（五）蕉特靈——是防治香蕉根腐病的特效藥劑，如在香蕉莖上發現象鼻蟲幼蟲為害（莖流膠或有洞孔）時，以「蕉特靈」加

二千倍，用人力噴霧器裝上注射針注射於

去要，市面上無法購到。（徐茂樟）

最可靠有信用的 DDVP 乳劑。
爲照顧全省民衆食用蔬菜、水果的
安全、推薦農友，採用本藥劑防治
蔬菜、茶、水果害蟲。



日農滴滴微皮乳劑

農林廳農藥登記證第274號

包裝：100c.c. 500c.c.

防治範圍：

蔬菜：青蟲、夜盜蟲、小菜蛾、菜螟蟲、蚜蟲。

油菜：蚜蟲（龍蠅）

柑桔：紅蜘蛛、蚜蟲、椿象、介殼蟲類。

洋菇：消毒菇床、防治跳蟲、菇蠅等。

特點：本劑係速效性藥劑，因具有急速分解之特性，故對於需要毒性消失快速之蔬菜、茶、水果等作物，用於收穫三、四天前的撒佈最為適當又安全

進口現貨供應 **泰洋股份有限公司**
臺北市重慶北路2段108號 電話：44994

製造廠 日本農藥株式會社
東京・大阪