

防治蘆筍金針蟲

用「阿特靈」或「飛佈達」

【問】：最近在蘆筍園發見有一種如標本的害蟲，潛入土壤中近根部處。請問：

(一)此種正名及日名何物？

(二)是吸取根部營養分或直接咬斷根部？

(三)可用何種藥劑防治？用「ヘプタ」可以嗎？怎樣施用？(大甲鎮文武里德興路三十六號劉朝輝)

【答】：(一)所寄來害蟲標本是金針蟲，俗稱鐵線蟲，就是叩頭蟲(捲米龜)的幼蟲，日名叫「ハリガネムシ」。

(二)金針蟲多潛伏在土中蛀食作物地下部，不是吸取養分。

(三)此蟲除害蘆筍根部外，常會鑽入地下莖，尤其嫩莖中蛀食。

防治金針蟲，應該在種植蘆筍前，施土中才有良好效力，已種蘆筍之地如發現有金針蟲為害，也可再施藥防治，每分地用四十多阿特靈可濕性粉一合升，或二·五多飛布達四·五公升，平均撒施植株下，並立即用鋤頭入拌土中四、五寸深，可防治之。(張長傳)

【問】：(一)晚生橙類如晚命西亞，在北部之臺北近郊或近宜蘭地方，可否大量栽培，或栽培何類為佳？

北部種柑金柑

株距依種類而異

【問】：(一)晚生橙類如晚命西亞，在北部之臺北近郊或近宜蘭地方，可否大量栽培，或栽培何類為佳？

(二)柑橘種植距離多少最適當？近來有人說密植留果至形擁擠時再行間伐，不知其法可行否有缺點嗎？(基隆市中正路一〇八之二號陳玉麟)

【答】：(一)晚生橙類如晚命西亞等，在臺北或宜蘭附近不適栽培。由於本省北部開花及結果初期雨水過多，故落花與落果現象嚴重，加之颱風後潰瘍病之發生頗嚴重，不該大面積種植。北部地區仍栽培柑與金柑為宜。

(二)柑桔之株距仍依地力、山坡斜度及品種等而有異。目前農林廳農復會之推廣標準，柚子為二十四×二十四公尺。甜橙為二十×二十二公尺。椪柑、桶柑為二十×二十公尺。檸檬為十八×十八公尺。金柑為十五×十五公尺。如地力較瘦或根盤等弱勢苗木，植距可稍縮小。

計劃密植法僅限於平坦且富有人工之地區實行。計劃密植栽培法請參照本刊十四卷二十期十一頁。(翁仁祿)

鞣製兔毛皮幾個問題

【問】：(一)鞣製兔毛皮水漬時容易發臭，毛常脫落，請問要加什麼藥品，或有其他較好方法？

(二)剝裏的工作真難做，請問用什麼工具或有較好的方法？

(三)兔仔在飼養中，易使毛色不潔白，請問用漂白粉漂洗，是否可以漂白，或用什麼藥品處理？

(四)鞣製好的毛皮，肉面變黃色，請問是否鞣製不當？有什麼方法補救使肉面白色？(苗栗苑裡鎮新復里九一號莊玉松)

【答】：(一)水漬毛皮時主要的是經常換水，否則會臭，不用什麼藥品。

(二)剝裏用刀口不銳的刀，要仔細的做，沒有什麼好方法，多做就易了，平平的放在一塊木板上，用刀輕刮。

(三)兔仔在飼養時應注意清潔，不可有糞尿污染了毛，否則不易洗除，這種不白的毛皮價值低。

(四)毛皮內面變黃是鞣製不完全所致，可能鞣製的一階段時間不夠，鞣製後磨底，該是灰白色。(黃立華)


番石榴多產果實

需要肥料水份充足

【商】：請問東部所栽的中山月拔，會使用充足的化學肥料及自給肥料，且曾剪定，為何果實總不如西部的大，是何原因？是土壤欠缺某種微量元素或氣候的關係？(花蓮吉安鄉化仁村化仁一八〇號廖萬池)

【答】：本省一千公尺以下的地區栽培

永興牌輕油發動機



最信用，最可靠，最標準
外銷國產品，臺灣省合作
金庫及臺糖公司特推推薦
，合約採用可獲分期付款
。(北部顧客請連絡臺北
營業處)

專門製造

抽水機	發動機	馬力	保證效果
3吋	3-4馬	8-10.5	省油耐用
4吋	4-6馬	13-15	物美價廉
5吋	6-8馬		
6吋	8-10.5馬		
8吋	13-15馬		

※中日技術合作，嚴格品質管制，榮譽出品。
※中央標準局註冊商標，申請註冊在案。
※臺灣省檢驗局，性能檢驗報告確到國際標準。

永興造機股份有限公司

(TEL 2171) 號 111 路 愛仁市義嘉：司公總
(TEL 53371) 號 326 路西安長市北臺：處業營北臺

來福利



新貨已到
即請購用



雞白痢的特效藥「福利來」為供
應新雞育成的成功特別實行八折
大優待。
每罐一筒月祇花八角藥費，保證
百發百成，既可安心又可獲利。

各地均有代售

「說明書備索」

享譽已久
公認的效力

Furella
'フレラ'

總代理：英商卜內門化學工業有限公司
經銷處：國際藥房
臺北市中正路一八〇〇號
臺北市長安東路一段三九號