


榮獲世界
十三國
專利權

用一元
賺十元



久保柑桔新鮮 減少貯藏損失10%

- 保持柑桔原來的水份和色香。
- 保持柑果糖份、酸度及其他果汁成份。
- 使柑桔鮮艷美麗，增加價值。
- 長久貯藏，減少失重及腐爛損失。
- 人畜無害。

(文獻備索)

柑桔、果菜保鮮劑

沃溢滴
OED-100

台聯藥品公司 TEL:47436
台北市南京東路二段29號

番石榴，都很適宜，要維持高產量和大果形，必須具備充分的肥料和土壤水分。員林一帶的番石榴產量高和果形大，就是因為那裡的土壤肥沃，土壤水分很充足的關係，在天氣乾燥時期所結的果實，一般都較小。但如能給予人工灌溉時，果實仍可結得很大。你施的肥料雖然很多，但如施肥時期的天氣很乾燥，果實的發育仍將受到影響，而不會結得很大。花蓮地區多雨，適合生產冬春的番石榴，這時期的價格很高，可增加農民的收益。(張振市)

電石處理鳳梨

應在晚間實行

【問】：(一)現在是電石處理的末期，時間已很迫切，但天不下雨，水源不便，該如何補救？

(二)電石處理為何要在晚間？

(三)白天處理效果如何？

(四)白天和晚上處理，其效果比較何者為佳？

(五)如何處理才能得到最高之效果？
(六)對鳳梨果肉的影響如何？
(七)電石水處理和電石處理，何者為佳？
(八)電石水該白天或晚上處理為佳？(彰化鎮山脚里一八號陳德吟)

【答】：(一)鳳梨園如水源不便，可採用電石粉處理，每株用量〇·五至一·〇克，施於鳳梨根部即可。
(二)電石處理要在夜間舉行，因夜間氣溫較低，處理之效果較高。
(三)白天處理一般效果均比夜間處理相差約半以上。
(四)夜間處理效果較佳。
(五)為提高處理效果，應行處理二次比較安定(第一次處理後隔一星期再行第二次處理)。

(六)電石處理產生果實與一般果實之品質並無差別，但處理時期對品質有關。
(七)電石水較佳。
(八)不論電石水或電石粉，均在早晨太陽

未上京以前處理為佳。(黃榮瑞)

初產母猪冬季配種 減少日本腦炎感染

【問】：貴刊九月十五日刊載有關豬之日本腦炎防疫，請問：(一)該日本腦炎疫苗本省是否可購到，何處有售？
(二)是否有必要從日本聯絡進口或訂購？
(三)高雄市三民區建興街四四之四號陳秋雄(高雄畜試所試驗製造研究中，待該所試驗結束，確認有效後即可正式製造販賣，供一般用戶做為日本腦炎預防之用。

(四)日本腦炎沒有正式進口供應，可否進口請洽詢有關機關。豬日本腦炎常發生於第一胎(有百分之九十以上)，第二胎以後就很少發生，故第一產母豬之配種最好選冬天(十二月—一月)蚊子較少發生時期，就可減少日本腦炎之感染。(張聯欣)

服務最好，零件充足，本省銷量最多。

西德製 爽樂牌動力噴霧器

- 農復會推薦，高雄區、臺中區青果合作社大量採購，防治葉斑病。
- 農林廳、糧食局，舉辦共同防治隊採用噴水，藥量最多。



主要進口貨品
野馬發動機，竹下耕耨機，有光高壓噴霧機，動力穴掘機，一次耕米機，稻谷乾燥機，飛馬汽油引擎。
竹下農機公司
本公司：臺北市武昌街2段118號之1
電話 33320
臺中保發廠：臺中市北屯路245號
電話 5178

