



高，品質最好，五三，一五四，年陳先生的蕉產量每公頃平均達四百八十三

註：直接成本包含工資、肥料、支柱材料、間接成本稅賦折舊並不包含在內，惟各蕉園大致相同。

項目	平均生產量	平均總收益	平均直接生產成本	減	增
(每公頃)	(公斤)	(元)	(元)	(元)	(元)
陳君示範蕉園	二二、一六〇	一二七、四一八	二七、九〇〇	九九、五一八	
附近一般冬蕉園	一九、八〇〇	九九、〇〇〇	二七、〇六〇	七一、九四〇	
比較	(十)三、三六〇	(十)二八、四一八	(十)八四〇	(十)二七、五七八	(十)七十

蕉，且大部分為合格外銷品，他的收益較一般冬蕉園高百分之三十八，前表是詳細的收支情形。

以上陳先生栽種冬蕉最近十六年的寶貴經驗，如能按照上述的選苗、定植等方法去做，不獨高屏地區生產冬蕉當無問題，全省其他各地蕉園，如能參照這些原則和各地自然環境，調整種植和施肥的時期，實施集約管理，相信生產任何季節香蕉的單位產量必高，品質最好，收益最高。

管理若週到

，免使果指變成畸形。
疏果：因為冬蕉自抽穗後即入寒冷季節，此時香蕉的代謝作用變慢而多不宜超過六段即六個果手，疏果時，在最後的果段上必須留果指一、二指，如此可減少發生軸腐病，將來採蕉可以用手握住，採蕉方便，不會擦傷。

增產三分一

是否套袋，是決定品質好壞的最大因素，因為冬蕉果房加以套袋，可避免寒風的襲擊，防止日光的照晒，黑星病亦不致發生，同時能增進果實

的光澤，提早充實。套袋的時機宜在斷蕾後一星期果指開始正形時實施。割除枯葉：香蕉出穗後，在未實行套袋前，常被蕉葉擦傷，因此應每天巡視蕉園，發現有可能擦傷果實的蕉葉應即割除，尤其是包裹葉更應注意。防寒：為防止寒風的侵害，除了在果實行套袋外，最好用草覆蓋，或用地下水灌溉蕉園，可保持土壤溫度。最早在二月中旬開始採收，三月上旬可大量收穫，至三月下旬則大部收完，採收時應同時把老株砍倒。並將支柱拔起，準備下次使用。由於陳先生採用以上的進步方法，認真管理，每年香蕉單位產量都很

豐收的原動力！

豐年牌農藥



豐年牌

果樹·蔬菜·病蟲害之防治

- | | | | | | |
|------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 殺蟲淨 | 賽文 | 甲基巴拉松 | 樂農家 | 農家福 | 廣節福 |
| 微量元素 | 除蟲菊 | 富速靈 | 強力保必安 | 保必安 | 馬拉松 |

興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路五九號
電話：五〇八七・五〇八八・五〇八九號