

玉米栽培  
臺灣  
期中，有許多病害與蟲害發生。這些病蟲害不但影響玉米產量，而且降低玉米的品質。

玉米病蟲害的發生，常因地區或氣候變化而不同，例如露菌病，只發生於南部蔗區，秋季嚴重；玉米煤紋病多發生於北部，春季比秋季嚴重；玉米螟為害猖獗；玉米病害比玉米螟為害嚴重；而蟲害方面主要者有玉米螟、穗蟲、大螟和夜蛾等。臺灣玉米每年因受此等病蟲害影響而引起的減產，粗略估計約在成以上。茲將主要病蟲害及其防治方法簡述如下：

## 賴文揚

# ！害蟲病米玉意注

## ▼ 玉米露菌病

露菌病，是甘蔗和玉米的共同病害，病原菌是同一菌種，可以互相傳播。玉米患病後，沿葉脈平行出現白色條斑，並生出白色粉末物；這就是病原菌的孢子梗和分生孢子。本病是由分生孢子藉風、雨和灌溉水傳播的。病株矮化不抽穗，影響產量很大。通常發生於玉米幼苗期，播種後達三十日的植株已不易發生。

防治法：應於發芽後隨時注意巡視田間，如發現病株，應立即拔除，並隨時深埋土中，切勿再移動以免蔓延。臺南區農業改良場朴子玉米研究中心，為澈底解決露菌病的威脅，正積極從事抗病性品種的育種工作，預計明年就有新的抗露菌病雙雜交玉米品種推廣。

本病容易發生於出穗期以後營養狀態不健全，或急激衰弱時。春季發生嚴重，病斑先為紡錘形，帶青灰色至灰綠色的斑點，漸次擴大，周邊褐色。患病程度嚴重時，全葉枯萎，果穗吊下，影響收量。預防方法：應焚燒病葉，充分施肥，避免連作。基肥多用堆肥，追肥則施人糞尿及硫酸銨以維持生育後期營養。藥劑防治：「大生二二」四百倍水溶液具有防治效果，於病斑出現時立即噴藥，以後每隔七天施藥一次，共施二至四次，或至病勢已被顯著遏阻時為止。

## ▼ 玉米葉斑病

本病發病適溫較比煤紋病為高，

請選用最可靠之 ······

日本イハラ 

臺灣庵原



中日合資·歷史悠久·信譽卓著的

各種殺蟲，殺菌劑

馬	力	重	乳	劑	50
立	斃	(DDVP)	乳	劑	50
甲	基	巴拉松	乳	劑	40
巴	拉	松靈達	乳	劑	46.6
安	特	達	乳	劑	19.5
飛	佈	ト	乳	劑	20
サ	ル	ウエツツ	水	和劑	90
新	阿	蘇	液	劑	6.5
阿	蘇	仁			



臺灣庵原農藥股份有限公司  
臺北市承德路83號3樓 電話：51023・52023