

分地可施氣化鈣七十五公斤左右，石灰一百二十—一百五十公斤。

(在貴地種晚生花椰菜，似應種植「鹽水晚生」為佳。全省各地種子行均有出售種子，向鹽水鎮農會洽購似較適宜。每畧兩價約八十一—一百元。

(「長岡交配初秋甘藍」不適農歷三月中旬播種，該品種之耐暑、耐雨及抗病等均屬中等。

(「長岡交配初秋甘藍」的葉球片為白色，如在適期(九月)種植，每個葉球重量有一·五—二·〇公斤。

(「適於農歷三、四月種植的甘藍甚少，請試用「晚普」(トツブ)或「金力」。

(「興農三季甘藍」不適農歷三、四月栽培，但適於農歷一月種植，耐暑與抗雨等近似「初秋甘藍」，但較耐貯運。每葉球重量有一·二—一·五公斤。

(「適於種植甘藍及花椰菜之土壤反應為五·六—六·七度。(玉蓮生)

適合春季栽植的甘藍蕃茄品種

【問】：(1)甘藍預定國曆十二月播種，以何種最為適宜？
(2)「三季甘藍」、「初夏再(號)」及「溪湖種」等適合此期播種嗎？

(「早田春期播種蕃茄，以何種較適合？(彰化伸港鄉全興村一一八號陳茂金)

【答】：(1)國曆十二月播種，翌年初春收穫的甘藍，以溫帶性品種較適宜，如「長岡交配一號」或「初秋甘藍」等。

(2)「三季甘藍」與「初夏再甘藍」均為日本一代雜交品種，是否適宜十二月播種，尚未明瞭，又溪湖種屬溫帶品系，如在十二月播種，通常在結球前已行抽苔，有時在苗期開始抽苔開花，因此不適十二月播種。


(3)目前可適合春播的蕃茄品種為數不少，如「瑪那露西」、「瑪那里」、「夏光」及「員林柿形種」(俗稱)等都可以春季播種。(廖梅桂)

柑桔葉面施肥

秋後應即停止

【問】：(1)柑桔的尿素葉面施肥應配合幾倍水施用？一日當中何時噴射比較適當？
(2)約十二年柑桔樹，施豆餅應否先予發酵？如何發酵比較好？豆餅之功效是否與堆肥相同？
(3)約十二年生之柑桔樹在白雲前(國曆七、八月間)，新芽應否剪除？剪除後能否促進果實成長？
(4)柑桔果實不大原因何在？(嘉義市文化路八〇號王火樹)

【答】：(1)柑桔尿素之葉面噴射濃度依氣溫不同約可分為三種：即五—八月間用〇·五% (一斗水中加尿素二·四兩)。九—十月間用〇·八% (一斗水中加尿素三·八兩)。十一—三月間用一% (一斗水中加尿素四·八兩)。



一般尿素的葉面噴射應在夏期完妥，因秋期以後如再噴射，易使果實着色且品質降低。

(2)一般豆餅浸水發酵後使用較為妥當，但操作不便使用於大面積或山地柑桔園。

常有困難，故十二年生大株可不必先發酵，以粉碎後直接施用即可。豆餅與堆肥雖同為有機質肥料，但所含成分有差異，即大豆餅含氮七·二，磷一·三，鉀二·〇；推肥含氮〇·五〇，磷〇·二五，鉀〇·五〇%。

(3)十二年生柑桔樹所結出之夏秋芽(白露芽)除非植株樹冠有擴大之必要，是可全部剪除，詳細方法請參考本刊上期出版柑桔特輯中之「柑桔修剪及整枝」一文。夏秋芽剪除後雖然可促進果實成長，但易降低貯藏能力。

(4)柑桔果實不大原因很多，如結果過多，樹勢衰弱，葉數太少，乾燥過度等，均可使柑桔果實長不大。(翁仁祿)

最老牌三共 DDVP 保證使你蔬菜豐收 速効性殺蟲劑



滴死乳劑 <農藥登記證397号>

包裝：100 cc 300 cc 500 cc

使用後五分鐘內即發生効力每隔3—1星期以一千倍撒佈一次保證殺死下列害蟲

防治範圍

- 蔬菜：青色、夜盜虫、小菜蛾、菜蚜虫、蚜虫
- 油菜：蚜虫(龜蠅)
- 柑桔：紅蜘蛛、蚜虫、椿象、介殼虫類、
- 洋菇：消毒菇床、防治跳虫、菇蠅、


日本 三共株式会社 榮譽出品

台灣總代理店 中國化學製業股份有限公司

經銷處：台灣南興泰貿易公司 台中市市府路116号

永興貿易行 彰化市中正路363号

10カ—10



日本·東京銀座
三共株式会社
台灣總代理店
中國化學製業股份有限公司