

境而定：茲將數種參考書
列下請斟酌採用參考：

(1) 氮素滅蟲法（陳茂
松著，養鯉淺說第九十
一頁臺灣省水產試驗所印
行民國五一年三月）
(2) 海水治法（同上）
(3) 地特松(Dipterex
) 治法（同上）
(4) BHC 治法（農業
要覽第十輯）第二卷養殖
(第三編三六二頁)

(5) 高錳酸鉀溶液為病

重洗澡法：在水溫 $15-2$
 0°C 時，用 $1/50,000$ 濃度法
病重 $1.5-2$ 小時，水溫 $21-39^{\circ}\text{C}$ 時，
用 $1/100,000$ 濃度浸 $1.5-2$ 小時，三日
後蟲全死。

問五：施肥時在早上好還是晚上
好？魚池裏有很多魚，可否施過磷酸
？

答：只要工作方便，什麼時候都
可施化肥。但以上午為最好。化肥要
先溶解於水，然後散佈水面，效力較
大，上午散出，有日光，植物性浮游
生物即可利用。施過磷酸若先將其
溶解後，散佈池中，對池魚數量和種
類沒有妨害。

問六：豆粕類踏在泥中與洒在水
中，那個較好？塊狀好或粉碎好？

答：豆粕類施於池中，其最大功
效是做魚類餌料。還未被魚食定的一
部分就變成肥料。所以投豆粕須在一
定地點數處，以便魚來取食。切不可
碎成小塊，以免魚食定的一

部就變成肥料。所以投豆粕須在一
定地點數處，以便魚來取食。切不可
碎成小塊，以免魚食定的一
部分就變成肥料。所以投豆粕須在一
定地點數處，以便魚來取食。切不可
碎成小塊，以免魚食定的一

魚類 (放 每尾 魚苗 ○○○ 尾 數 年中 (公斤) 可獲總 量	養 ○○○ 魚 鍵				
	大頭 草魚 鯪 鯽 鯉 鯽	大頭 草魚 鯪 鯽 鯉 鯽	大頭 草魚 鯪 鯽 鯉 鯽	大頭 草魚 鯪 鯽 鯉 鯽	大頭 草魚 鯪 鯽 鯉 鯽
魚類 (放 每尾 魚苗 ○○○ 尾 數 年中 (公斤) 可獲總 量	100	100	100	100	100
大頭 草魚 鯪 鯽 鯉 鯽	100	100	100	100	100
鯪 鯽 鯉 鯽	110	110	110	110	110
鯽 鯉 鯽	100	100	100	100	100
鯉 鯽	50	50	50	50	50
鯽	50	50	50	50	50
總共	1000	1000	1000	1000	1000

問七：綠肥是什麼？怎樣施較好
？

答：綠肥是新鮮植物之花朵葉皮
、根各部容易腐敗化為氮、磷、鉀、鈣
、鎂等肥料，如我們常見之紫雲英、
合歡、豆科厚葉植物之類。

施放方法隨時隨地不同，最簡單
的是採割野生植物堆積於池之一角令
其自然腐敗，以供浮游生物及一切蟲
類繁殖，這些浮游生物及蟲類就是魚
的餌料，另一比較有系統的方法是冬
季乾涸時，池底播種豆科植物，紫雲
英、苜蓿等二、三個月，然後放水養
魚，即獲綠肥之效。

問八：廄肥要踏在泥中，抑是放
在水中？

答：不必踏入泥中，放施水中便
可。

問九：化學磷肥是給魚直接食用
，抑或供浮游生物與水草作營養素？

答：化學磷肥須先由浮游生物及

水草吸收利用為有機物，然後魚類始

賽文* SEVIN*

為答謝賽文用戶
我們印好「中華民曆」
請向
當地興農公司駐區代表
或買賽文農藥店索取
我們恭祝您今年
再有豐收大發財！



美國永備有限公司

賽文總經銷

興農化工股份有限公司

* SEVIN 及賽文係美國永備公司出品 CARBARYL 殺蟲劑之中英文註冊商標