

# 農業信箱



## 「勃拉益斯」 「勃力丹」

### 可治在來稻熱病

【問】：(一)據植物保護推廣方法中在來稻熱病不能用有機永劑，但未寫明要用何藥，是否得病就無救？

【答】：(一)在來稻使用有機永劑，因會發生藥害，所以過去在來稻發生稻熱病，沒有適當的藥劑可防治。但經過試驗機關多年來之試驗，已發現「勃拉益斯」和「勃力丹」兩種藥劑可以防治在來稻熱病，並自五十四年下半年起正式列入推廣。

【問】：(一)依必安……(有機磷劑)不必混合，如果有與稻熱病同時發生，真的是不必混合，一項就有效果嗎？

【答】：(一)在來稻使用有機永劑，因會發生藥害，所以過去在來稻發生稻熱病，沒有適當的藥劑可防治。但經過試驗機關多年來之試驗，已發現「勃拉益斯」和「勃力丹」兩種藥劑可以防治在來稻熱病，並自五十四年下半年起正式列入推廣。

【依必安】或「必愛用」與「高米農

「或」紋枯」乳劑加展着劑在使用前混合，對藥效似無大影響，但「紋枯」乳劑等部份有機砒素劑為減輕對水稻之藥害，製造時有加入藥害緩和劑，如與其他藥劑混合經久可能引起化學變化，故不可混合後久置再用。  
【本省植物保護推廣方法之農藥混合表，是由專家收集各國之有關資料慎重編製，為避免農友們遭受損失，凡是有混合後發生不良後果之報告者，均列為不可混合以策安全。(李信怡)

## 委託榮民農墾處開地 臺南桃園機墾隊接洽

【問】：貴刊十五卷十九期農業新聞，有轉會榮民農墾處使用推土機為農友開墾耕地成績很好的報導。本人想要開墾一小山地做為平田，不知要向何機關申請辦理。(嘉義縣中埔鄉深坑村一〇四號張丁興)

【答】：計劃委託榮民農墾處利用機械推土開墾者，請直接向下列兩處洽辦：(一)臺南區機墾隊：臺南市逢甲路三〇四號，電話臺南八七五。(二)臺北區機墾隊：桃園縣中壢鎮普仁里七十七號之一，電話四九六。(張曾剛)

## 香蕉過大吸芽遺株芽 不宜採用作為種蕉苗

【問】：香蕉除芽後，再由殘留部份吐芽，日後將此芽留苗移植可否？

【答】：(一)香蕉吸芽切斷後再由殘留部份吐芽，如此吸芽已長高五十公分以上而切斷後再吐芽者，則不宜留芽栽植。  
(二)如芽體尚小，切斷後再吐出的芽與另外新發的吸芽栽植並無甚大差異，否則能影響抽穗期及產量。(王兆全)

最老牌三共 DDVP 保證使你蔬菜豐收 速効性殺蟲劑


# デス

滴乳劑 <農藥登記證397号>

包裝：100 cc 300 cc 500 cc  
使用後五分鐘內即發生効力每隔3—1星期以一千倍撒佈一次保證殺死下列害蟲

- 防治範圍
- 蔬菜：青虫、夜盜虫、小菜蛾、菜螟虫、蚜虫
  - 油菜：蚜虫(龜蠅)
  - 柑桔：紅蜘蛛、蚜虫、椿象、介殼虫類、
  - 洋菇：消毒菇床、防治蛾虫、菇蠅、

日本 三共株式会社 榮譽出品  
台灣總代理店：中國化學製藥股份有限公司  
經銷處：台灣南興泰貿易公司 台中市市府路116号  
永興貿易行 彰化市中西路363号



日本東京銀座 三共株式会社 台灣總代理店 中國化學製藥股份有限公司

花卉外銷的基本條件

【問】：(一)我對貴刊花卉特集頗感興趣，目前有否外銷？什麼草花才有經濟價值？  
 (二)「鬱金香」與「洋水仙」等之球根花卉本地還未見過，何處有售球根？  
 (三)聽說玫瑰花朵現在已有出口，是否屬實，何處辦理？(臺南柳營鄉八翁村四號陳南華)

【答】：(一)花卉要外銷，成爲一種外銷貨品，必須具備幾項條件：(1)要能長期不間斷的供應貨品，不能此月有下月無。(2)要能保持相當的數量，而且各季節數量相同，最好每月或每週均能供給幾千朵或幾萬朵鮮花。球根則要每年均有若干萬粒供應。(3)品質要好，目前各國花卉水準均高，花卉是注重品質的，品質不好，根本無法競爭。(4)價錢要低，即生產成本要盡量降低。總之，要花卉能長期供應，數量要，價廉物美，才有外銷希望。經濟價值較高的草花是香石竹與菊花二類。

(二)「鬱金香」與「洋水仙」是溫帶的球根花卉，所以在本省不易看到，臺北的種苗公司或有此種球根，請參照豐年社廣告內種苗公司，去信詢問。  
 (三)玫瑰花出口在試辦中，臺北市「仁山莊花店」曾經辦理過。(彭昌社)

改良四真蘿蔔

冬至以前播種

【問】：(一)改良四真蘿蔔在十二月下種，何時才可收穫？  
 (二)其生長期最適溫度爲攝氏幾度？  
 (三)每棵塊根重量有多少？(雲林利利鄉光復路二六號張復湧)

【答】：(一)十二月播種可在清明前後採收，注意改良四真蘿蔔要在冬至前播種，冬至後會生長不良，減少收量。  
 (二)生長期間是冬季，其平均氣溫爲十五至十八度。  
 (三)每株根重三十五臺斤，根長六十七臺寸，直徑三十四臺寸。(陳培昌)

蘆筍休眠期不施肥

採收前施冬肥一次

【問】：(一)本月栽植的蘆筍，進入休眠期後施肥是否會吸收？  
 (二)何種土壤最適宜栽培？  
 (三)對根瘤菌的抵抗力如何？  
 (四)採收期的老莖葉，可放任其自枯否？(花蓮吉安鄉化仁村化仁一八〇號廖萬沛)

【答】：(一)蘆筍休眠期無須施肥，但於春二月間開始採收前須施肥一次(冬肥)，然後培土。  
 (二)微酸性土壤最適宜栽培蘆筍。  
 (三)蘆筍會發生根腐病，但抵抗力程度尚需要試驗，據實際情形在栽植當初發生時植株發育不佳，確有影響其生長，但已經二三年的成株，其影響程度不大。  
 (四)停止採收後應讓植株自然生長，以培育地下莖及鱗芽。(王進生)



調製石灰硫磺合劑

注意配量煮沸時間

【問】：(一)按照貴刊「石灰硫磺合劑調製法」，調製出來的濃度爲何？有波美十六度，而不達二十八度？

【答】：(一)原液十六度要加水稀釋成〇·四度應如何計算？  
 (二)測量波美度數要用那種器具？  
 (三)硫磺與硫酸有何不同，是否均可製成石灰硫磺合劑？

【答】：(一)按照日文「柑桔栽培新說」石灰硫磺合劑的調合法，硫磺粉四百五十公克，生石灰二·三公斤，是否可調製成波美二十八至二十九的石灰硫磺合劑。(嘉義番路鄉大湖村二六號林丙木)

【答】：(一)可能煮沸時之熱度不够或硫磺之粉碎度不够，因用人工粉碎硫磺工作不易，致有塊狀粒不易溶解，可將煮沸時間延長至二二三小時，塊狀硫磺應打碎後磨成粉狀，即可達到波美二十八度。新竹青果合

應有盡有!!

豐年牌農藥

爲您服務



果樹·蔬菜·病蟲害之防治

蘆筍	農家福	樂農家	甲基巴拉松	殺蟲淨	馬拉松	保必安	強力保必安	富速靈	除蟲菊	賽文	微量元素
----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	------

興農化工股份有限公司  
 臺中縣大里鄉內新路59號  
 電話：5087 · 5088 · 5089

作社製造方法係硫磺二十四公斤，生石灰十二公斤，加水約一百二十公升，煮沸攪拌（用機器）約三小時，做出波美二十八—三十度之石灰硫磺合劑九十公升左右。

（二）波美十六度要稀釋波美〇·四度，即加水四十倍。

（三）量石灰硫磺合劑係用鹽波美度計。

（四）硫磺與塊狀硫磺均同樣含有硫素，但前者係塊狀硫磺加以精製（昇華）使純硫素含量提高者，當然也可作石灰硫磺合劑，但成本較高，一般均用塊狀硫磺。

（五）按日文「柑桔栽培新說」所載調製法，硫磺粉四百五十公克，生石灰二·三公斤調成石灰硫磺合劑十八公升事，可能硫磺粉應該是四·五公斤才對（按硫磺與生石灰比別應為二比一）。（曾煥秋）



蠶兒五百五十頭

生產蠶繭一公斤

【問】：（一）「秦康」蠶種何處有售？要多少隻？蠶才產一公斤的絲？

（二）新品種桑樹，何處可買到？（楊梅高山里一七號陳蘭昭）

【答】：（一）「秦康」蠶種為蠶業改良場新近育成的抗熱性品種，適宜夏李飼育（夏李因炎熱，一般蠶種無法適應），由於夏季桑葉茂盛，過去無法利用養蠶，故「秦康」蠶種育成後，在夏季可大量繁殖生產蠶繭。

（二）生產一公斤蠶繭，約需蠶兒五百五十頭左右。

（三）「秦康」蠶種是多化性交二化性之蠶種，孵化期可用人為控制。

（四）楊梅地區為苗栗蠶絲廠推廣範圍，如希望栽桑養蠶，所需桑苗及蠶種（包括「秦康」蠶種），可逕向該廠申請洽配。（地址在苗栗公館鄉玉泉村一百號）（洪鍾銓）

【問】：（一）白蘭花應如何繁殖？

（二）有香味的灌木花或喬木花有幾種？（高雄旗山嶺口篤實巷一九號陳德振）

【答】：（一）白蘭花可用播種、壓條及嫁接等法繁殖，在本省多用壓條法繁殖。

（二）其他常見之木本香花有茉莉、素馨、桂花、含笑、鶯爪花及梔子等。（士林園藝試驗分所）

老葉可用插莖繁殖

【問】：（一）老葉栽培應選何種土壤？

（二）老葉種苗何處有售？每棵若干？

（三）栽植多久時間，才能收穫？

（四）幾天施肥一次？

（五）其「摘芽」及「護縛」工作，有無特別注意事項？

（六）其支柱、橫架等應於何時為適宜？

（七）老葉樹每柱（三棵為一柱）之平均產量多少？

（八）老葉之壽命有幾年？（臺中市東區大智路二九二巷二二號楊鎮瑞）

【答】：（一）苗圃本省俗稱「老葉」，為多年生蔓莖植物，葉與檳榔石灰混合咀嚼時，有興奮作用，栽培土壤以含有有機物之肥沃土壤為宜。

（二）本省野生於南部各山地，如高雄、恒春、蘭嶼、綠島山野中較多，或栽培於田中，在恒春種苗採自山野間，偶見有人在市場出售，價格每株僅一、二角，

（三）栽植後如生長良好迅速發葉，數個月後即可摘葉，通常以蔓莖插條繁殖。

（四）如果土壤太薄而缺乏有機物時應施肥，摘葉數次後為促使迅速生長發葉，即應施肥一次，時間並無一定，視栽培及摘葉情況而定。

（五）摘芽及摘葉時不可過份，無特別注意事項。

（六）插條後開始生長蔓莖發芽時，即應設支橫架。

（七）無調查資料產量不詳。

（八）因係多年生蔓莖植物，可維持相當時間，無實際資料壽命長短不詳。（章樂民）

請選用最可靠之.....

日本イハラ 臺灣庵原 IHARA

中日合資·歷史悠久·信譽卓著的

各種殺蟲，殺菌劑

- 馬力重 劑50
- 立斃(DDVP) 劑50
- 甲基巴拉松 劑40
- 巴拉松 劑46.6
- 安飛特靈 劑19.5
- 飛佈達 劑20
- サルウエツト 水和劑90
- 新阿蘇仁 液劑6.5



臺灣庵原農藥股份有限公司  
臺北市承德路88號3樓 電話：51023·52023

樣果加工外銷  
經濟價值頗大

【問】：(一)種植新品種樣果如「愛文」較種植柑桔的經濟價值如何？  
(二)新品種樣果的前途如何？是否可外銷或加工製罐？

【答】：(一)樣果的長途運輸有什麼較好的包裝法？因其體積大而柔軟，容易受傷。(臺南縣玉井鄉望明村七三號王德晉)

【答】：(一)栽種樣果，因生長期短，病蟲害少，管理成本低，果樹壽命長，售價高，依經濟觀點看，較種植柑桔為優。

(二)將來一定要走上外銷及加工。

【樣果長途運輸在包裝容器上，應力求堅韌美觀，故以採用木箱或紙箱內裝糠殼、鋸屑、木屑或用軟中空纖維板隔開，以免撞傷而影響品質。(王求全)】



紅色土壤種桃樹  
不可施酸性肥料

【問】：(一)桃葉發紅有斑點，是營養不良或發生病害，用什麼藥物治療？  
(二)桃樹種於紅色土壤內，休眠期間施何種肥料為宜？

【答】：(一)桃葉發紅有斑，可能是病害，因未過乾旱，無法判斷。桃樹在根部吸收不良或過於乾旱或將近落葉時皆有發紅的現象。可就近請農業技術人員代為鑑定。

(二)桃樹種於紅色土壤內，休眠期施基肥，宜注重用中性或鹼性肥料，如硝酸銨或氰化鈣之類，因紅色土壤大多為酸性不太適合桃樹生長。施追肥時亦同。

【桃苗移植後其下部發生新枝，其原來

之老枝枯萎，可以將老枝基部剪除，令新枝發育，但須注意如新枝由砧木部發出者，必須於發生時將此新枝剪除。(朱長志)

藍瑞斯種公豬  
一年開始交配

【問】：(一)藍瑞斯種有那些優點？  
(二)藍瑞斯公豬的形態特徵如何？

【答】：(一)藍瑞斯種公豬的優點：(1)發育較臺灣現有的其他豬種快，生後六個月達一百公斤，大約每日可增重〇·八公斤。(2)繁殖性能強，每胎平均生產十一頭。(3)育成率高(有八十五%)。(4)離乳頭數九、七頭。(5)乳維高(平均一百三十五公升)。(6)飼料利用效率(換肉率)三·三。(7)屠宰率高，屠體長，脂肪薄，瘦肉多。

(二)藍瑞斯公豬，體型長，被毛白色，頭部長，鼻直。後側面看呈流線型，但臀部很發達，耳架特大向前垂而覆蓋額面，四肢垂直。成年公豬可達三百至四百公斤。

【藍瑞斯公豬普通八個月體重一百二十公斤左右，此時精子數不多，精液量亦少，十個月精子數與精液量漸增多，可以開始交配，但以年齡一年後開始交配為最好，使用壽命約為三年，如提前早配，將來可能縮短使用壽命。

【公豬應以每三天交配(採精)一次為宜，不可每天交配，如此才不致縮短使用壽命，最好以人工授精方式，以經濟使用精液。

【公豬交配期間，應提高營養，飼料中蛋白質必須達十八%以上，且其中三十五%須用動物性蛋白質(如魚粉或蛋類)。


【八十公斤體重的公豬，如發育正常其年齡大約為五、六個月，性尚未熟，當然不知道交配，並無毛病，再等二、三個月後試配之。(張聯欣)】

◎好消息

豐田牌(犁口一タリ)耕耘機

本機裝配美國可達發動機  
最好，最理想，汽油，石油適用

豐田16型



操作簡便堅固耐用

性能

犁耕每甲13小時  
耙平每甲9小時  
油每甲7加倫  
耗油每小時30公升  
拖車每小時

豐田農機工廠

臺中市五權路六號

享譽已久  
公認的效力

福利來

Furella  
'フレラ'



新貨已到  
即請購用



「說明書備索」

各地均售

總代理：英商卜內門化學工業有限公司  
臺北市中正路一八〇〇號  
經銷處：國際家畜藥物廠  
臺北市長安東路一段三九號