


作社製造方法係硫磺二十四公斤，生石灰十二公斤，加水約一百二十公升，煮沸攪拌（用機器）約三小時，做出波美二十八—三十度之石灰硫磺合劑九十公升左右。

（二）波美十六度要稀釋波美〇·四度，即加水四十倍。

（三）量石灰硫磺合劑係用鹽波美度計。

（四）硫磺與塊狀硫磺均同樣含有硫素，但前者係塊狀硫磺加以精製（昇華）使純硫素含量提高者，當然也可作石灰硫磺合劑，但成本較高，一般均用塊狀硫磺。

（五）按日文「柑桔栽培新說」所載調製法，硫磺粉四百五十公克，生石灰二·三公斤調成石灰硫磺合劑十八公升事，可能硫磺粉應該是四·五公斤才對（按硫磺與生石灰比別應為二比一）。（曾煥秋）



蠶兒五百五十頭

生產蠶繭一公斤

【問】：（一）「秦康」蠶種何處有售？要多少隻？蠶才產一公斤的絲？

秦康一種一年能孵化幾代？

（二）新品種桑樹，何處可買到？（楊梅高山里一七號陳國昭）

【答】：（一）「秦康」蠶種為蠶業改良場新近育成的抗熱性品種，適宜夏李飼育（夏李因炎熱，一般蠶種無法適應），由於夏李桑葉茂盛，過去無法利用養蠶，故「秦康」蠶種育成後，在夏季可大量繁殖生產蠶繭。

（二）生產一公斤蠶繭，約需蠶兒五百五十頭左右。

（三）「秦康」蠶種是多化性交二化性之蠶種，孵化期可用人為控制。

（四）楊梅地區為苗栗蠶絲廠推廣範圍，如希望栽桑養蠶，所需桑苗及蠶種（包括「秦康」蠶種），可逕向該廠申請洽配。（地址在苗栗公館鄉玉泉村一百號）（洪鍾銓）

白蘭花用壓條繁殖

【問】：（一）白蘭花應如何繁殖？

（二）有香味的灌木花或喬木花有幾種？（高雄旗山嶺口篤實巷一九號陳德振）

【答】：（一）白蘭花可用播種、壓條及嫁接等法繁殖，在本省多用壓條法繁殖。

（二）其他常見之木本香花有茉莉、素馨、桂花、含笑、簕爪花及梔子等。（士林園藝試驗分所）

老葉可用插莖繁殖

【問】：（一）老葉栽培應選何種土壤？

（二）老葉種苗何處有售？每棵若干？

（三）栽植多久時間，才能收穫？

（四）幾天施肥一次？

（五）其「摘芽」及「護縛」工作，有無特別注意事項？

（六）其支柱、橫架等應於何時為適宜？

（七）老葉樹每柱（三棵為一柱）之平均產量多少？

（八）老葉之壽命有幾年？（臺中市東區大智路二九二巷二二號楊鎮瑞）

【答】：（一）苗圃本省俗稱「老葉」，為多年生蔓莖植物，葉與檳榔石灰混合咀嚼時，有興奮作用，栽培土壤以含有有機物之肥沃土壤為宜。

（二）本省野生於南部各山地，如高雄、恒春、蘭嶼、綠島山野中較多，或栽培於田中，在恒春種苗採自山野間，偶見有人在市場出售，價格每株僅一、二角，

（三）栽植後如生長良好迅速發葉，數個月後即可摘葉，通常以蔓莖插條繁殖。

（四）如果土壤太薄而缺乏有機物時應施肥，摘葉數次後為促使迅速生長發葉，即應施肥一次，時間並無一定，視栽培及摘葉情況而定。

（五）摘芽及摘葉時不可過份，無特別注意事項。

（六）插條後開始生長蔓莖延時，即應設支橫架。

（七）無調查資料產量不詳。

（八）因係多年生蔓莖植物，可維持相當時間，無實際資料壽命長短不詳。（章樂民）

請選用最可靠之.....

日本イハラ



臺灣庵原



中日合資·歷史悠久·信譽卓著的

各種殺蟲，殺菌劑

馬力	重	劑	50
立斃	(DDVP)	乳	劑
甲基	巴拉松	乳	劑
安飛	特靈	乳	劑
サル	ウエツト	水和	劑
新阿	蘇仁	液	劑



臺灣庵原農藥股份有限公司
臺北市承德路88號3樓 電話：51023·52023