

豐年牌農藥

大家恭禧

慶祝
豐收



果樹·蔬菜·病蟲害之防治



豐年牌

- 微量元素
- 賽文
- 除蟲菊
- 富速靈
- 強力保必安
- 保必安
- 馬拉松
- 甲基巴拉松
- 殺蟲淨
- 蘆筍福

興農化工股份有限公司

臺中縣大肚鄉中和村中山路十之六號 電話：島日106號

為限。

(一)根據新竹區農業改良場區域試驗結果，在該區尚可栽培。

(二)在花連地區每公頃平均產量，第一期作五千三百二十公斤，第二期作五千二百九十八公斤。(花蓮改良場)

病蟲害

防治稻紋枯病藥劑

注意稀釋免生藥害

【問】：水稻發生紋枯病，經使用「新阿蘇仁」和「紋枯」乳劑兩種，結果施用新阿蘇仁之區域比較枯乳劑區域多發生黃萎病，鄰居農友亦有此現象，是否前者之藥劑容易發生藥害？或施用方法有錯誤？(苗栗銅鑼鄉中平村一四八號陳松)

【答】：(一)防治稻紋枯病所用的「新阿蘇仁」和「紋枯」(モシ)乳劑等有機硫素劑，如使用濃度過高，很容易發生藥害，所以使用時應切實按照農林廳頒發「植物保護推廣方法」所定倍數使用。

蠶桑

桑果種植四年

產量六十公斤

【問】：去年看報說：栽桑果一公頃二年後得利十萬元以上，本人已購苗種植，至今已有一年六個月未有開花結實，貴刊於五十四年十月十六日第九頁再刊出：栽二年後每株生產一百公斤桑果。故特函請指教應如何管理，產量才能達到每株一百公斤。(旗山鎮所峯里蔣源興)

(二)稻黃萎病是由黑尾浮塵子媒介傳播的一種毒素病，黑尾浮塵子經吸收罹病稻株養液，其體內就可能含有毒素，在秧田或木田假使有這種帶毒的黑尾浮塵子飛來為害，就會將毒素傳染到健全的稻株，稻株感病後經過一箇月左右的潛伏期才會發病，所以不同區域的水田，依其在秧田或木田初期，受到帶毒黑尾浮塵子為害程度不同，發病有所不同，並非因使用「新阿蘇仁」或「紋枯」等藥劑發生藥害而引起黃萎病。(李信也)

【答】：(一)本場選育果桑兼用種桑樹，需四年後產量才達六十公斤。(二)目前以各方爭購種苗，致有些苗圃品種不純，品系紛雜，不知所購係何品種，桑樹依品種不同管理法亦不同，請將品種、種植管理及土壤性質等列明，或到蠶桑改良場或其指導所說明，可按實際情形給予指導。(洪輝銓)

藥用桑「臺桑一號」

二年生開始採葉

【問】：蠶業改良場育成新品種桑樹，從種植至可摘葉的成熟期間，需要多久？(花蓮新城鄉博愛路二四號蔡龍成)

【答】：來信所指桑樹新品種，未知是何品種？本省現在推廣藥用品種有「臺桑一號」，育苗需一年，二月定植後如管理良好者秋期株高可達一·五公尺以上，第二年春可開始採葉，但數量不多，第三年後才會增多。(洪輝銓)

病牛

治療牛膨脹病 服藥管理並重

【問】：我家有黃牛，約五歲，外觀非常肥壯，耕耘非常有力，可惜常患膨脹病，請獸醫診治結果判定「胃腸卡塞兒」，引起慢性膨脹症，繼續由獸醫治療月餘，未能痊癒，現在該牛症狀為白天沒有異狀，等到每天晚上毛病就發生，腹部膨脹很厲害，未知這種情形，應如何治療，要內服什麼藥品，才能根治。(嘉義新港鄉溪社村七六號陳金祥)

【答】：依來信所述情形，確是慢性膨脹病，是由胃腸而引起，治療這種病，不是短期可能治療，也不能全靠藥物來治療，除了藥物治療外，還要注意飼養管理，如通便是最要緊的，此外飼料也要注意，易酸酵的飼料如青草草葉雲英等類。至于藥物，除促進消化及強健胃腸之藥物外，再加一點薄荷腦，並且內服藥時要有恆與守時，繼續下去，或許能治癒此病。(黃立章)