



農業信箱

果樹

果園中耕可促進生育
深度要注意果樹習性

果率，爲何比往年大爲減少？

〔問〕：(一)今年東勢區柑桔結實條件，在開花前或後期需注意什麼管理？

〔答〕：(一)促進果樹花芽形成，需要那幾個有利條件？在開花前或後期需注意什麼管理？

〔問〕：(一)今年東勢區柑桔結實條件，在開花前或後期需注意什麼管理？

〔答〕：(一)木省中部一帶，由於去年冬季氣溫過高，地溫亦高，以致柑桔根部組織生長，炭水化合物無法蓄積於地上部，引起花芽形成不良，花數減少。

〔問〕：(一)今年東勢區柑桔結實條件，在開花前或後期需注意什麼管理？

〔答〕：(一)木省中部一帶，由於去年冬季氣溫過高，地溫亦高，以致柑桔根部組織生長，炭水化合物無法蓄積於地上部，引起花芽形成不良，花數減少。

〔問〕：(一)今年東勢區柑桔結實條件，在開花前或後期需注意什麼管理？

〔問〕：(一)橫山梨外銷不合格品之處理問題，最好由社員擬妥意見，經社員代表提出理事會辦理，似較適宜。(翁仁祿)

橫山梨中生種好

〔問〕：(一)橫山梨外銷不合格品之處理問題，最好由社員擬妥意見，經社員代表提出理事會辦理，似較適宜。(翁仁祿)

〔問〕：(一)橫山梨外銷不合格品之處理問題，最好由社員擬妥意見，經社員代表提出理事會辦理，似較適宜。(翁仁祿)

〔問〕：(一)橫山梨外銷不合格品之處理問題，最好由社員擬妥意見，經社員代表提出理事會辦理，似較適宜。(翁仁祿)

〔問〕：(一)橫山梨外銷不合格品之處理問題，最好由社員擬妥意見，經社員代表提出理事會辦理，似較適宜。(翁仁祿)

蕉香

香蕉抽穗後
還是施肥

〔問〕：(一)香蕉抽穗以後是否還要施肥？如要施肥，什麼肥料效果較好？(屏東高樹鄉源泉村泉興路二八號陳福成)

〔答〕：(一)香蕉抽穗以後還要施肥，其目的在使每一果指肥大，增加果重，所施肥料，仍以氮磷鉀三要素配合適當比率爲佳，即每株每年施硫酸銨九百公克，過磷酸鈣八百八十公克，氯化鉀八百公克(合計約四毫斤)。吐穗前施二·七毫斤。吐穗後施一·三毫斤，換言之，吐穗前施肥量要多，爲求增多果手數(段數)，吐穗後施量最少，只求增加果手重。(王兆全)

磷鉀葉面施肥

作物不易吸收

〔問〕：(一)用尿素、氯化鉀及過磷酸石灰混合水溶液，噴施於香蕉葉面，未知可否？其三要素肥效約有多少能由葉面吸收？

〔答〕：(一)近聞歐、美、日等國家已普遍採用三要素葉面施肥，效果甚好，是否真實？(屏東高樹鄉源泉村泉興路二八號陳福成)



飼料 母粉 磚

質白蛋高
料飼命維

含有豐富營養，容易吸收，其功效如下：

- 飼省節四 (四) 肥快大大 (一)
- 間時養飼短縮 (二) 疫防壯強 (二)
- 益收加增 (六) 蛋生加增 (三)

飼料母粉使用量：

雞	13%	5%
鴨	15%	6%
豬	16%	8%
牛	7%	8%
馬	7%	8%
狗等	7%	8%

號七〇一段二路北山中市北臺
三六〇三五·八三六〇五：話電

銷經司公限有業企福糖

