

東高樹鄉新豐村拓林路十號(溫明經)

【答】：尿素噴施葉面吸收最多且快，如用〇·五—一·〇%濃度尿素，噴施後二十五分鐘，即有六十五%被吸收。至於磷、鉀肥甚難由葉部吸收，故無人噴施。
〔除尿素可行葉面噴施外，氯化鉀與過磷酸鈣在國內外尚未見有葉施報告。(王兆全)〕

蔬菜

臺北二號胡瓜

不適採收花瓜

【問】：(一)四葉胡瓜可否自行採種？產量多少？
(二)臺北二號胡瓜可否採收花瓜，收量如何？

【答】：(一)九月十月播種胡瓜，以何品種較適合(花蓮玉里鎮長里里一二四號陳和平)

【答】：四葉胡瓜如不是雜交種，可自行採種，但須選優良母株才好。四葉胡瓜每十公畝產量約三千公斤。
(二)臺北二號胡瓜係大胡瓜，不太適宜作花瓜。每十公畝產量約四千二百—六千公斤。

【問】：(一)九—十月栽培胡瓜，在花蓮地區可種「立秋品種」。(王進生)

生育初期氮肥過多

容易引起番茄落果

【問】：(一)我所栽培番茄果形高扁未知是何品種？是否「媽娜露西」其特性如何？
(二)開始第一段花及第二段花，都是落花落果是何原因？
(三)第三至六段花才有結果實，第七段花以上全都脫落是何原因？有何法補救？

【答】：(一)我所栽培番茄果形高扁未知是何品種？是否「媽娜露西」其特性如何？
(二)開始第一段花及第二段花，都是落花落果是何原因？
(三)第三至六段花才有結果實，第七段花以上全都脫落是何原因？有何法補救？

【答】：(一)臺端所種的品種似不是「媽娜露西」，「媽娜露西」的果形較扁圓，據推測似為 Rutgers 品種。
(二)落花原因可能是氮素施用過多引起，尤以生育初期氮素過多，落果落花現象較嚴重。

重。

〔番茄一般著果至六、七段，而七段以後著果不良，此係因植株營養不良關係。西青來標本似為番茄褐斑病，以四—六次石灰波爾多液噴射三—四次較宜。(王進生)〕

初種蘆筍園

可間作花生

【問】：(一)今年農曆八月初間作包心菜、大豆、落花生等，請問此三種作物何種較適合？
(二)適合春作的包心菜有什麼品種？(林進益)

【答】：(一)今年八月種植蘆筍，如管理良好，在明年春季約能達到採收階段，故其間作宜視蘆筍目前的生育情形而定。如蘆筍生育尚差，間作物採用落花生較宜。
(二)適合春作的包心菜有「濱綠」與「長岡交配六十六」兩種。(王進生)

害蟲病

洋菇褐斑病

用大生防治

【問】：(一)「大生」是否可治「褐斑病」？如何使用？其加水倍數以多少為宜？時常使用對於菌種或已長出的菇體有何害處？
(二)通常所說的「水傷」和貴刊所載的「褐斑病」是否同一種病？各有何方法或藥品防治？又目前洋菇產量日少，有何補救方法？(雲林大埤鄉嘉興村廓前寮五號簡克應)

【答】：(一)大生 M-22 可以防治洋菇褐斑病，其使用法，可先將罹病區洋菇全部採收後，施用大生五百倍稀釋液，每坪用量一—一·五公升藥液，均勻噴撒在覆土表面，每隔五—七天噴撒一次，連續噴撒二至三次。如時常使用不但增加栽培成本，而且會產生菇體遺毒危險。
(二)通常所說的「水傷」就是洋菇褐斑病，因為洋菇褐斑病發生之原因，是由於撒水



最老牌三共 DDVP 保證使你蔬菜豐收
速効性殺蟲劑
滴死剂乳劑 <農藥登記證397号>
包裝：100 cc 300 cc 500 cc
使用後五分鐘內即發生効力每隔3—1星期以一千倍撒佈一次保證殺死下列害蟲
防治範圍
蔬菜：青虫、夜盜虫、小菜蛾、菜螟虫、蚜虫
油菜：蚜虫(龜蠅)
柑桔：紅蜘蛛、蚜虫、椿象、介殼虫類、
洋菇：消毒菇床、防治蛾虫、菇蠅、
日本 三共株式会社 榮譽出品
台灣總代理店：中國化學製業股份有限公司
經銷處：台灣南興泰貿易公司 台中市市府路116号
永興貿易行 彰化市中正路363号